

SAATGUTLISTE 2025 (Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Liste)

INHALTSVERZEICHNIS:

| | | | |
|---|--------------|----------------------------------|--------------|
| BLATTGEMÜSE | 1-4 | KÜRBISGEWÄCHSE | 18-20 |
| SALAT | 2-4 | GURKEN | 18 |
| GETREIDE und AMARANTH | 4-9 | KALEBASSEN | 19 |
| AMARANTH | 4 | KÜRBIS | 19-20 |
| GERSTE | 4-5 | MELONEN | 20 |
| HAFER | 5-6 | MAIS | 20-22 |
| HIRSE | 6 | NACHTSCHATTENGEWÄCHSE | 23 |
| REIS | 7 | AUBERGINE | 23 |
| ROGGEN | 7 | PAPRIKA mild | 23-25 |
| WEIZEN | 7-8 | PAPRIKA scharf | 25-29 |
| HÜLSENFRÜCHTE | 8-15 | RARITÄTEN | 29 |
| BUSCHBOHNEN | 8-10 | TOMATEN | 29-45 |
| STANGENBOHNEN | 10-12 | OBST | 45 |
| FEUERBOHNEN | 12 | RARITÄTEN | 45 |
| ERBSEN | 12-13 | ÖLPFLANZEN | 45 |
| SOJABOHNEN | 13-14 | ÖL- und ZIERPFLANZEN | 45-46 |
| LINSEN | 14 | DIVERSE RARITÄTEN | 46-47 |
| RARITÄTEN | 14-15 | ERDNÜSSE | 47 |
| KOHLGEWÄCHSE | 15 | WILD- UND BEIKRÄUTER | 47-48 |
| HEIL- ,WÜRZKRÄUTER UND FÄRBEPFLANZEN | 15-18 | KÜRBISGEWÄCHSE | 49 |
| FÄRBEPFLANZEN | 15 | WURZEL- UND KNOLLENGEMÜSE | 49-50 |
| HEILKRÄUTER | 15-17 | ZIERPFLANZEN | 50-54 |
| WÜRZKRÄUTER | 17-18 | ZWIEBELGEWÄCHSE | 54-55 |

| Bestell-Nummer | Volksname | Sorte | Art | Infraspez. Taxa | Beschreibung |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| BLATTGEMÜSE | | | | | |
| A-08-03-001 | Amaranth, Aufsteigender Fuchsschwanz | 'Roter Meier oder Blutkraut' | Amaranthus lividus L. em. Thell. | convar. lividus | Alte, fast vergessene Spinatpflanze mit roten Blättern, ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Verwendung: Blätter und junge Blütenstände gedünstet, junge Blätter roh zum Salat, Samen wie Amaranth. |
| A-08-05-001 | Gemüse-Amaranth | | Amaranthus gangeticus | | Auch dreifarbiger Fuchsschwanz, Zier- und Heilpflanze, auch als Gemüse nutzbar, einjährig |
| A-16-01-005 | Stangensellerie | 'Plain Blanc Pacal' | Apium graveolens L. | var. dulce | Hell-gelbgrüne Blattstiele und Laub, etwas empfindlich |
| A-21-01-001 | Garten-Melde | 'Butterkraut' | Atriplex hortensis L. | | Grünblättrige, früh reifende Sorte aus dem Schwarzwald, die dort traditionell als Blattgemüse genutzt wird. |
| B-02-01-002 | Blatt-Mangold | 'Lucullus' | Beta vulgaris L. | ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. cicla L. s.l. | Sehr dekorativer, gelbgrüner Blattmangold mit stark blasigem Laub. Aus der Genbank Braunschweig. |
| B-02-01-003 | Stiel-Mangold | 'Glatter Silber' | Beta vulgaris L. | ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. flavescens DC. f. leucopleura (Alef.) Voss | Dunkelgrüne, kleine Blätter und sehr stark verbreiterte weiße Blattstiele. |
| B-02-01-005 | Stiel-Mangold | 'Feurio' | Beta vulgaris L. | ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. flavescens DC. f. rhodopleura (Alef.) Voss | Stielmangold mit dunkelroten Blättern und leuchtend roten Blattstielen, sehr dekoratives Gemüse. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte. |
| B-02-01-012 | Einjährige Bete | | Beta vulgaris L. | | Chinesische Herkünfte ohne Rübe und mit wenigen Rosettenblättern. Die Pflanzen blühen und fruchten bei uns im ersten Jahr. |
| B-05-02-001 | Rüben-Senf Kohl | | Brassica juncea (L.) Czern. | ssp. napiformis (Paill. et Bois) Gladis | Rotlaubige Sorte mit kleiner, scharfer Rübe. |
| B-05-02-002 | Blattsenf | 'Golden Streaks' | Brassica juncea (L.) Czern. | var. japonica Bailey | Gelbgrünes, fein geschlitztes Blattgemüse von außergewöhnlichem Geschmack, etwas scharf. |
| B-05-02-003 | Blattsenf | 'Red Streaks' | Brassica juncea (L.) Czern. | var. japonica Bailey | Rötliches, fein geschlitztes Blattgemüse von außergewöhnlichem Geschmack, etwas scharf. |
| B-05-04-001 | Schwarzer Senf | | Brassica nigra (L.) Koch | | Gründungs- und Ölpflanze, selten als Blattgemüse verwendet. |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| C-18-02-001 | Durchblättrter Erdbeerspinat | | Chenopodium foliosum Asch. | | Wenig ergiebiges, spinatartiges Gemüse, auch Zierpflanze, die leicht verwildert. |
| F-00-01-001 | Ausdauernder Buchweizen | | Fagopyrum dibotrys (D.Don) H.Hara | | Winterhartes Knöterichgewächs. Die jungen Blätter und Sprosse werden roh oder wie Spinat gekocht gegessen. Mit der Zeit entwickelt sich eine stattliche Pflanze von bis zu 1,20m Höhe, von der man ordentlich ernten kann. Abgabe nur während der Vegetationszeit |
| M-02-02-001 | Gemüse-Malve | 'Hohe Glattblättrige ' | Malva verticillata L. | var. chinensis (Mill.) Danert | Die jungen Blätter können gedünstet, frittiert oder wie Spinat zubereitet werden. Bis 1,80m hohe kräftige Pflanzen. Frostempfindlich. |
| M-02-02-002 | Gemüse-Malve | 'Hohe Krausblättrige ' | Malva verticillata L. | var. crispa L. | Spinatartiges Gemüse, die jungen Blätter können frittiert werden. Auch Zierpflanze. |

SALAT

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| C-21-01-002 | Endivie | 'Escariol' | Cichorium endivia L. | var. latifolium DC. | Altbewährte Handelssorte. Robuste, wüchsige, schmackhafte Endiviensorte mit gezahntem Blatt und kräftigem Wuchs |
| C-21-02-002 | Chicorée | ohne Namen | Cichorium intybus L. | var. foliosum Hegi | Zwischenergebnis eines Zuchtversuchs für Interessierte: das gebleichte Laub der Mutterpflanze ist rot gefleckt. |
| C-21-02-003 | Chicorée | ohne Namen | Cichorium intybus L. | var. foliosum Hegi | Zwischenergebnis eines Zuchtversuchs für Interessierte: das gebleichte Laub der Mutterpflanze ist ungefleckt. |
| L-01-02-002 | Butter-Kopf-Salat | 'Brauner Troztkopf' | Lactuca sativa L. | convar. incocta Helm var. capitata L. | Kopfsalat, bei niedrigen Temperaturen stärker rot gefärbt. |
| L-01-02-003 | Butter-Kopf-Salat | 'Butterkracher' | Lactuca sativa L. | convar. incocta Helm var. capitata L. | Bildet keinen festen Kopf, langsam schießend, vollgrün. |
| L-01-02-004 | Butter-Kopf-Salat | 'Großer Bunter Forellen' | Lactuca sativa L. | convar. incocta Helm var. capitata L. | Lockerkopfiger Kopfsalat mit zarten rot gesprenkelten Blättern. |
| L-01-02-008 | Butter-Kopf-Salat | 'Neckarriesen' | Lactuca sativa L. | convar. incocta Helm var. capitata L. | Nicht sehr fest schließender Kopfsalat. |
| L-01-02-011 | Butter-Kopf-Salat | 'Stuttgarter Sommer' | Lactuca sativa L. | convar. incocta Helm var. capitata L. | Hellgrüner-gelbgrüner Sommer-Kopfsalat mit großem rundem Kopf und gutem Geschmack, widerstandsfähig und spät schießend. Erstzulassung 1952. |
| L-01-02-014 | Pflück- oder Schnittsalat | 'Frisby' | Lactuca sativa L. | convar. incocta Helm var. crispa L. | Kompakter, kräftig grüner Schnittsalat mit grob gekraustem Blatt. |
| L-01-02-016 | Pflück- oder Schnittsalat | 'Grünetta' | Lactuca sativa L. | convar. incocta Helm var. crispa L. | Schmalblättriger, leicht blasiger, grüner Schnittsalat. |
| L-01-02-017 | Pflück- oder Schnittsalat | 'Hohlblättriger Butter' | Lactuca sativa L. | convar. incocta Helm var. crispa L. | Schmalblättriger, leicht blasiger, grüner Schnittsalat. |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------|---|---|--|
| L-01-02-018 | Pflück- oder Schnittsalat | 'Lions Tongue' | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>incocta</i> Helm var. <i>crispa</i> L. | Bildet rosettenartige kleine Köpfe mit zungenförmigen kräftig grünen Blättern. Durch die dicken Blattstiele unübertroffen knackig. Eher spät schossend. |
| L-01-02-020 | Pflück- oder Schnittsalat | 'Slobolt' | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>incocta</i> Helm var. <i>crispa</i> L. | Grober Eichblattsalat mit gelbgrünen Blättern. |
| L-01-02-022 | Pflück- oder Schnittsalat | Herkunft: Ungarn | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>incocta</i> Helm var. <i>crispa</i> L. | Heterogener, teils zeitig schossender grüner Schnittsalat. |
| L-01-02-024 | Spargel-Salat | 'Cracoviensis' | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>sativa</i> var. <i>angustana</i> Irish ex Bremer | Spargelsalat mit ausgeprägtem Rosettenstadium, rotherzig. |
| L-01-02-025 | Spargel-Salat | 'Grüne Rübe' | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>sativa</i> var. <i>angustana</i> Irish ex Bremer | Grüner Spargelsalat mit sehr stark verdickter, auch roh genießbarer Sproßachse. |
| L-01-02-026 | Spargel-Salat | ohne Namen 1 | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>sativa</i> var. <i>angustana</i> Irish ex Bremer | Spargelsalat mit aufstrebenden Rosettenblättern. |
| L-01-02-028 | Römer-Salat | 'Forellenschluß' | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam. | Aufstrebende, rot gesprenkelte Rosettenblätter. |
| L-01-02-029 | Römer-Salat | 'Gallega' | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam. | Sehr schmalblättriger Salat mit aufrecht abstehenden Rosettenblättern. Wegen des stark verdickten Sprosses eher als Spargelsalat verwendbar. |
| L-01-02-030 | Römer-Salat | 'Kaiser Selbstschluß' | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam. | Variabler Römersalat mit teils schließenden, teils nach außen neigenden Blattspitzen. |
| L-01-02-031 | Römer-Salat | ohne Namen | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam. | Einfach zu vermehrender grüner Roma-Salat. Von türkischen Immigranten kultivierte Landsorte. Weißsamig. |
| L-01-02-033 | Römer-Salat | Herkunft: Türkei | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam. | Weißsamig. Robuster, grüner Römersalat mit nach außen neigenden Blattspitzen. |
| L-01-02-034 | Garten-Salat | ohne Namen | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>sativa</i> var. <i>sativa</i> | Urtümlicher Gartensalat mit variabler, an Wildsalat erinnernder Form und Haltung der Blätter. Früher als Ölpflanze genutzt. Schwarzsamig. |
| L-01-02-035 | Römer-Salat | VEN-Neuentwicklung | <i>Lactuca sativa</i> L. | | Robuster, grüner Römersalat mit nach außen neigenden Blattspitzen. Schwarzsamig. |
| L-01-02-036 | Winter-Salat | 'Mombacher Winter' | <i>Lactuca sativa</i> L. | convar. <i>incocta</i> Helm var. <i>capitata</i> L. | Sehr früher, frischgrün glänzender Kopfsalat, klein-mittelgroß, ziemlich winterhart. Samen weiß. Breit rundes Blatt mit leicht gewellter Blattrand. |
| M-10-01-001 | Eiskraut | ohne Namen | <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L. | | Einjährige Gemüsepflanze mit fleischigen Sproßachsen und Blättern. Roh zu Salaten oder als spinatähnliches Gemüse. Braucht trockenen, sonnigen Standort. |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| M-99-09-007 | Feldsalat MIX | Mischung | Valerianella locusta (L.) Laterrade | | Mischung verschiedener Feldsalatarten und Sorten |
| V-02-01-001 | Gekielter Feldsalat | Herkunft: Eichstetten | Valerianella carinata Loisel. | | Hellgrüne, große Rosetten mit schlanken Blättern. Wächst wild in Getreidefeldern, in Weinbergen und an Wegrändern. Früher zu ernten als V. locusta. |

GETREIDE und AMARANTH

AMARANTH

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|---|--|
| A-08-00-001 | Indischer Gemüse-Amaranth | | Amaranthus sp. | | 2-3 m hoch wachsende blattreiche Gemüsepflanze. Gelegentlich rote Spots treibend, Samen schwarz. |
| A-08-01-001 | Rispen-Fuchsschwanz | 'Hopi Red Dye' | Amaranthus cruentus L. | | Roter Fuchsschwanz mit dunkelbraunen Samen. |
| A-08-01-002 | Rispen-Fuchsschwanz | 'San Martin' | Amaranthus cruentus L. | | Ocker-gelbsamiger Fuchsschwanz zur Korn- und Gemüseernte. |
| A-08-02-001 | Bastard-Fuchsschwanz | 'Deswia' | Amaranthus hybridus L. em. Robins. | convar. erythrostachys (Moq. in DC.) Thell. | Gelbsamige Sorte, fast 2 m hoch. |
| A-08-02-002 | Bastard-Fuchsschwanz | 'Mayo Indian' | Amaranthus hybridus L. em. Robins. | convar. erythrostachys (Moq. in DC.) Thell. | Etwa 2m hoher roter Fuchsschwanz, schwarzsamig. |
| A-08-04-001 | Ganges-Fuchsschwanz | ohne Namen | Amaranthus tricolor L. | convar. tristis (L.) Thell. | Blattgemüse mit rot-grünem Laub, schwarzsamig. |
| A-08-04-002 | Ganges-Fuchsschwanz | 'Papageienkraut' | Amaranthus tricolor L. | | Basale Blätter grün, obere grün-gelb, gelb und rot. Eßbare Zierpflanze. |

GERSTE

| | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| H-02-01-001 | Sommer-Gerste | 'Weihenstephener Schwarze Nackte' | Hordeum vulgare L. | convar. vulgare var. duplinigrum Körn. | Schwarze, mehrzeilige, lang begrante Sommergerste. |
| H-02-01-003 | Winter-Gerste | ohne Namen | Hordeum vulgare L. | convar. intermedium (Körn.) Mansf. var. nuditransiens (Körn.) Mansf. | Grau-braune Winter-Nacktgerste aus Nepal. |
| H-02-01-004 | Winter-Gerste | 'Han-bozu' | Hordeum vulgare L. | convar. intermedium (Körn.) Mansf. var. pavoninum (Körn.) Mansf. | Japanische gelbe Wintergerste. |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--|--------------------|----------------------------------|--|
| H-02-01-007 | Winter-Gerste | ohne Namen | Hordeum vulgare L. | convar. vulgare var. densum Sér. | Begrante, gelbe, mehrzeilige Wintergerste aus Indien. |
| H-02-01-008 | Winter-Gerste | 'Domaci Radic-Gerste' | Hordeum vulgare L. | | Gelbe Wintergerste aus Kroatien. |
| H-02-01-009 | Winter-Gerste | 'Jecam Kolaric' | Hordeum vulgare L. | | Gelbe, zweizeilige Wintergerste aus Kroatien. |
| H-02-01-010 | Sommer-Gerste | 'Dr. Francks Grannenabwerfende Imperialgerste' | Hordeum vulgare L. | | Gelbe, grannenabwerfende Pfauen- oder Imperialgerste. |
| H-02-01-011 | Winter-Gerste | | Hordeum vulgare L. | | Gelbe, mehrzeilige, begrante, bespelzte Wintergerste, ca. 1m hoch. |

HAFER

| | | | | | |
|-------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| A-22-00-002 | Bart-Hafer | | Avena barbata Pott ex Link | ssp. barbata | Graubrauner Spelzhafer. |
| A-22-02-001 | Mittelmeer-Hafer | | Avena byzantina Koch | | Ockerfarbenes, bespelztes Korn. |
| A-22-02-002 | Mittelmeer-Hafer | | Avena byzantina Koch | | Bespelzter Schwarzhafer. |
| A-22-03-001 | Flug-Hafer | 'Vötting' | Avena fatua L. | | Schwach beharter, brauner Flughafer. |
| A-22-03-002 | Flug-Hafer | Herkunft: Griechenland | Avena fatua L. | | Schwach beharter, braunschwarzer Flughafer. |
| A-22-03-003 | Flug-Hafer | Herkunft: Heiderhof, Bonn | Avena fatua L. | | 2000 gesammelt; Nachbau. |
| A-22-03-005 | Flug-Hafer | | Avena fatua L. | | Unkraut aus Eichstetten. |
| A-22-04-001 | Saat-Hafer | 'Kirsches Edelweiß' | Avena sativa L. | var. aristata Schldl. | Hellgelbe, bespelzte Sorte. |
| A-22-04-002 | Saat-Hafer | ohne Namen | Avena sativa L. | var. aristata Schldl. | Rund 1,5 m hoher, heller Spelzhafer aus Rumänien. Standfestigkeit gering. |
| A-22-04-005 | Saat-Hafer | ohne Namen | Avena sativa L. | var. krausei Körn. | Über 1,5 m hoher, recht standfester Spelzhafer aus Rumänien. |
| A-22-04-006 | Saat-Hafer | 'Hunsrücker Adel' | Avena sativa L. | var. ligulata Vav. | Gelbhafer. |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| A-22-04-007 | Saat-Hafer | ohne Namen | Avena sativa L. | var. macrantha (Hackel) Malz. | Braunsamig. |
| A-22-04-008 | Saat-Hafer | ohne Namen | Avena sativa L. | var. subuniflora (Trab.) Tab.-Mor. | |
| A-22-04-012 | Saat-Hafer | Herkunft: Spanien | Avena sativa L. | | 1 m hoher, brauner Futterhafer aus Spanien, wenig standfest. |
| A-22-04-013 | Saat-Hafer | 'Sangerhäuser' | Avena sativa L. | | Gelbhafer, heterogen, aus kleinflächigem Anbau seit 2006. |
| A-22-05-004 | Tauber Hafer | | Avena sterilis L. s.l. | | Wildart mit stark behaarten Deckspelzen und leicht ausfallenden Früchten. |
| A-22-06-001 | Sand- Hafer | | Avena strigosa Schreb. | | Schwarzer Rauh- oder Sandhafer. |

HIRSE

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------------------------|--|--|---|
| E-03-01-002 | Teff | ohne Namen | Eragrostis tef (Zucc.) Trott. | | Grau-gelbsamige Sorte, unter günstigen Bedingungen sind von den selben Pflanzen 2 Ernten möglich. |
| E-06-01-001 | Finger-Hirse | Herkunft: Martin Häfeli, Anhalonium | Eleusine coracana | | Einjähriges, trockenresistentes, kniehohes Getreide |
| P-01-01-001 | Hirse | 'Bernburger Rispenhirse' | Panicum miliaceum L. | convar. contractum Alef. var. fatyg Sireusov | Historisches Getreide für Breinahrung, heute Vogelfutter. |
| P-01-01-002 | Hirse | 'Herbstfeuer' | Panicum italicum L. | | Historisches Getreide für Breinahrung, heute Vogelfutter. |
| S-15-00-001 | Hirse | Mohrenhirse | Sorghum sp. | | Mohrenhirse. Schwarze Kolbenhirse. Sehr dekorativ in Garten und Sträußen, Nahrung für Vögel. |
| S-15-00-004 | Hirse | Zierhirse Dunkel | Sorghum sp. | | Zierhirse Dunkel. Vielseitig verwendbare Kolbenhirse, sehr dekorativ für große Sträüße. |
| S-15-00-005 | Hirse | Zuckerhirse | Sorghum sp. | | Zuckerhirse. Der süße Preßsaft aus den Trieben wird genutzt. |
| S-15-01-001 | Hirse | | Sorghum saccharatum (L. em. L.) Moench | convar. technicum (Körn.) Tzvel. | Vielseitig verwendbare, knapp 2 m hoch werdende Besenhirse mit braunen Spelzen, sehr dekorativ für große Sträüße. |
| P-05-01-001 | Perlhirse | | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | | Uralte afrikanische Getreideart mit außerordentlicher Dürre-resistenz. Auch Futterpflanze. Samen weiß. |
| P-05-02-001 | Perlhirse | | Pennisetum americanum | | 2-3 m hoch wachsende Perlhirse |

| REIS | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---|---|--|--|
| Z-03-01-001 | Wasser-oder Indianerreis | | Zizania aquatica L. | | Bis 3 m hohes einjähriges Gras für flache Gewässer, kann auch im Kübel angepflanzt werden. Langes, schwarzes Korn. Verkreuzt mit Z-03-02-002 |
| ROGGEN | | | | | |
| S-07-01-006 | Roggen | 'Steirischer Urroggen' | Secale cereale L. | ssp. cereale | Gelbsamiger, rund 2 m hoher, standfester Winterroggen. |
| WEIZEN | | | | | |
| T-10-01-008 | Winter-Weich- Weizen | ohne Namen | Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol. | var. ferrugineum (Alef.) Mansf. | Winterweizen-Landsorte mit langer, begrannter Ähre. Neigt zum Lagern, früh reifend. |
| T-10-01-013 | Sommer-Weich- Weizen | 'Abeloy' | Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol. | var. lutescens (Alef.) Mansf. | Früh reifender, grannenspitzi-ger Winterweizen. |
| T-10-01-015 | Winter-Weich- Weizen | 'Mir' | Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol. | var. lutescens (Alef.) Mansf. | Rund 1 m hoher, standfester Winterweizen. |
| T-10-01-019 | Winter-Weich- Weizen | 'Pobeda' | Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol. | var. lutescens (Alef.) Mansf. | Rund 1,5 m hoch werdender, standfester, früh reifender, grannenspitzi-ger Winterweizen. |
| T-10-01-028 | Weizen, Winter- Weich- | 'Braunspelziger Behaarter Binkelweizen' | Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol. | var. rubrum (Körn.) Mansf. | Etwa 1,8 m hoch, mit kopfig gedrängter, grannenspitzi-ger Ähre. |
| T-10-01-043 | Winter-Weich- Weizen | ohne Namen | Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol. | | Anscheinend mindestens 20 Jahre alter Weizen aus Abrisshaus |
| T-10-01-044 | Winter-Weich- Weizen | ohne Namen | Triticum aestivum L. em. Fiori et Paol. | | Ca. 1,7m hoher, lang begrannter Weichweizen mit lockerer Ähre. |
| T-10-02-001 | Äthiopischer Weizen | ohne Namen | Triticum aethiopicum Jakubz. | ssp. aethiopicum var. brownii (Percival) Filat. | Etwa 1 m hoher, lang begrannter, standfester Sommerweizen mit ockerfarbenem Korn. |
| T-10-02-003 | Äthiopischer Weizen | ohne Namen | Triticum aethiopicum Jakubz. | ssp. aethiopicum var. pseudobrownii (Percival) A.Filat. | Sommerweizen mit sehr hellen Körnern. |
| T-10-03-001 | Wild-Weizen | ohne Namen | Triticum araraticum Jakubz. | var. araraticum | Brauner, begrannter Winterweizen mit zerfallender Ähre. |
| T-10-05-002 | Wild-Weizen | ohne Namen | Triticum dicoccoides (Körn. ex Aschers. et Graebn.) Schweinf. | convar. dicoccoides var. spontaneovillosum (Flaksb.) Percival | Schwarz-gelber, spindelbrüchiger, begrannter Sommer-Wildemmer. Bis 1 m hoch werdend, mit hoher Lagerneigung. |
| T-10-06-003 | Winter-Emmer | ohne Namen | Triticum dicoccon Schrank | var. novicum Körn. | Gelber, begrannter, spindelbrüchiger Winter-Emmer. |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---|
| T-10-06-007 | Winter-Emmer | Avena americana 3 | Triticum dicoccon Schrank | | Avena americana 3. Gelber, begrannter Winter-Emmer. |
| T-10-06-008 | Winter-Emmer | Avena forestiera 1 | Triticum dicoccon Schrank | | Avena forestiera 1. Gelber, begrannter Winter-Emmer. |
| T-10-06-011 | Sommer-Emmer | ohne Namen | Triticum dicoccon Schrank | | Brauner, begrannter Sommer-Emmer. Standfest, ca. 1m hoch. |
| T-10-07-005 | Sommer-Hart-Weizen | Herkunft: Türkei | Triticum durum Desf. | | Niedriger Sommerweizen mit langen, schwarzen Grannen, erträgt Trockenheit gut. |
| T-10-07-006 | Sommer-Hart-Weizen | | Triticum durum Desf. | | Rund 1 m hoch werdender, standfester Sommerweizen aus Korsika. |
| T-10-07-007 | Winter-Hart-Weizen | ohne Namen | Triticum durum Desf. | var. reichenbachii Körn. | Früh reifender, ca. 1,8 m hoher, standfester Winter-Hartweizen, hell begrannt. |
| T-10-08-007 | Winter-Einkorn | ohne Namen | Triticum monococcum L. | | Schwarzes Winter-Einkorn. |
| T-10-10-009 | Winter-Spelz-Dinkel | 'Tiroler Roter Dinkel' | Triticum spelta L. | ssp. spelta var. duhamelianum (Mazz.) Körn. | Etwa 1,7 m hoch werdender, ertragreicher, doch nicht standfester Dinkel. |
| T-10-10-011 | Winter-Spelz-Dinkel | Blauer Winter-Kolbendinkel | Triticum spelta L. | var. alefeldii Körn. | Blauer Winter-Kolbendinkel. Hellbrauner, unbegrannter Winter-Spelz. |
| T-10-10-012 | Winter-Spelz-Dinkel | Blauer Samtiger Winterspelz | Triticum spelta L. | var. coeruleum Alef. | Blauer Samtiger Winterspelz. |
| T-10-10-020 | Winter-Spelz-Dinkel | 'Winterdinkel Emmelmann A' | Triticum spelta L. | | Früh reifender, brauner, etwas grannenspitziiger Winter-Spelz. 1,5 m hoch, nicht standfest. |
| T-10-11-001 | Winter-Kugel-Weizen | 'Czan-Fe-Chu' | Triticum sphaerococcum Percival | var. malkoffii Stank. | Über 1,5 m hoch, standfest. Ähre gedrunen, verzweigt. |
| T-10-13-001 | Kamut-Weizen, Khorosan-Weizen | | Triticum turanicum | | Sommerweizen, natürliche Hybride zwischen Hartweizen und einer Weizen-Wildform aus dem Iran, schwarz begrannte Ähre, Korn länger als Hartweizen |

HÜLSENFRÜCHTE

BUSCHBOHNEN

| | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| P-12-03-001 | Buschbohne | 'Altmärker' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Buschbohne mit langem Schnabel, Blüten weiß-gelb, Hülsen hellgrün und ca. 15 cm lang, Samen mittelgroß, halb rot, halb weiß, Nabel weiß. Ähnlich "Ungarische". |
|-------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---|

| | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| P-12-03-004 | Buschbohne | 'Bobis d'Albenga' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Buschbohne mit gelb bis rosa-violetten Blüten, grün-lila gesprenkelten, 10-15 cm langen Hülsen und nierenförmigen, beige geaderten und dunkler gesprenkelten Samen. Nabel braun gerandet. Schwertbohne. |
| P-12-03-006 | Buschbohne | Braun-weiße Buschbohne ohne Namen 2 | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Buschbohne mit gestreckten braun, ocker und violett gestreiften, an einem Ende weißen Samen. |
| P-12-03-007 | Buschbohne | 'Canadian Wonder' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige, weiße Prinzeßbohne; Same ähnlich Stangenbohne "Klosterbonner". |
| P-12-03-008 | Buschbohne | 'Domaca Stojanovic' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Buschbohne, Samen mittelgroß, eiförmig, gelb. Nabel weiß mit braunem Rand. |
| P-12-03-009 | Buschbohne | 'Dugonja' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Buschbohne, Samen groß, nierenförmig, rosa. Nabel weiß mit braunem Rand. |
| P-12-03-010 | Buschbohne | 'Eichstetter Grüne Kochbohne' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Samen länglich, weiß. Grüne Kochbohne. |
| P-12-03-012 | Buschbohne | Einlochbohne B. Schmidt | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Buschbohne, Samen dunkelgelb, Nabel weiß mit braunem Rand. Aussaat einzeln in 20cm Abstand. |
| P-12-03-013 | Buschbohne | Einlochbohne M. Schulz | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Buschbohne, Blüten gelb-bis hell-violett, grüne 11-20 cm lange Hülsen, Samen gelblich, Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand. Aussaat einzeln in 20cm Abstand. |
| P-12-03-014 | Buschbohne | 'Eisbohne Schmidt' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Buschbohne, kältetolerant. Samen nierenförmig, ocker, Nabel weiß. |
| P-12-03-017 | Buschbohne | Fadenlose Einlochbohne | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fadenlose Einlochbohne. Fadenlose Buschbohne. Samen eiförmig-rhomboid, gelb. Nabel weiß mit braunem Rand. |
| P-12-03-019 | Buschbohne | 'Fin de Bagnols' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Filetbohne mit langem Schnabel. Samen langgestreckt, zylindrisch, beige mit roten Streifen. Nabel weiß mit braunrotem Rand. |
| P-12-03-021 | Buschbohne | 'Flamenta' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Frühe, sehr ertragreiche, fädige Sorte mit weißen Samen. |
| P-12-03-022 | Buschbohne | 'Karlsruher Markt' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Sehr ertragreiche Sorte mit grünen Hülsen. Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet (ähnlich 'Saxa'). |
| P-12-03-026 | Buschbohne | Herkunft: Mexiko | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Buschbohne mit schmalen, leicht aufspringenden, verschiedenfarbigen Hülsen. Samen rundlich, klein, schwarz, Nabel weiß. |
| P-12-03-027 | Buschbohne | 'Moosbacher Orangebraun' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Buschbohne. Samen mittelgroß, länglich, bräunlich, Nabel weiß. |

| | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| P-12-03-029 | Buschbohne | ohne Namen | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Buschbohne, fädige Landsorte. Samen länglich, ocker; Nabel weiß, braun gerandet. |
| P-12-03-030 | Buschbohne | ohne Namen | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Grüne, fadenlose Buschbohne, von La Palma. Samen beige, dunkler geädert, Nabel ocker. |
| P-12-03-031 | Buschbohne | 'Purple Teepee' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Ertragreiche Buschbohne mit violetten Blüten und dunklem kräftigem Laub. Fadenlose, blaue, 10 cm lange Hülsen, die beim Kochen grün werden. Samen hellbraun, geädert, Nabel weiß mit ocker Rand. Filetbohne. |
| P-12-03-032 | Buschbohne | 'Rote Indien' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Reiserbohne, fädig. Samen mittelgroß, nierenförmig, weinrot, Nabel weiß. |
| P-12-03-033 | Buschbohne | 'Saxa' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Teils fadenlose, teils fädige Buschbohne, grün, Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet. |
| P-12-03-034 | Buschbohne | 'Schwarze Buschbohne Sgarz' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fadenlos, Samen etwas gestreckt, schwarz, Nabel weiß. |
| P-12-03-035 | Buschbohne | Schwarze Filetbohne ohne Namen | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Filetbohne. Früh reifende fadenlose Buschbohne mit schlanken Hülsen. Samen länglich, schwarz. |
| P-12-03-038 | Buschbohne | 'Suppenbohne Wybelsum' | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Buschbohne. Hülse fädig, lang geschnäbelt, gelb. Samen nierenförmig, mittelgroß, beige-rosa, Nabel weiß mit ockerfarbigem Rand. |
| P-12-03-041 | Buschbohne | Herkunft: Ungarn | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Fädige Buschbohne mit langem Schnabel, Samen mittelgroß, halb rot, halb weiß, Nabel weiß. Ähnlich "Altmärker". |
| P-12-03-044 | Buschbohne | Einlochbohne | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Aussaat einzeln in 20cm Abstand. |
| P-12-03-046 | Buschbohne | Wachs Rheinland | Phaseolus vulgaris L. | var. nanus (Jusl.) Aschers. | Gelb-weiße Blüten, gerade, dünne, 10-15 cm lange schlanke hellgelbe Hülsen, Samen halb weiß halb violett gesprenkelt, Nabel braun. |

STANGENBOHNEN

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|
| P-12-00-003 | Stangenbohne | 'Wildtäler' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Stangenbohne. Fadenlose Hülse, schmal, gegliedert erscheinend. Samen rundlich, rot. Nabel weiß. Regionale Sorte aus dem Wildtal bei Freiburg. |
| P-12-03-505 | Stangenbohne | 'Beigekrumm' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Etwas 2 m hoch rankende, frühe Sorte. Blüte weiß, Frucht fädig. Samen beige, flach. Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand. |
| P-12-03-507 | Stangenbohne | 'Blauhilde' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Stangenbohne mit blauen Hülsen, etwas fädig. Samen ocker, Nabel weiß. |
| P-12-03-509 | Stangenbohne | 'Butterbrodt (fädig)' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Sehr ertragreich. Blüte violett. Hülse fädig, grün mit violetten Streifen. Samen mittelgroß, flach, beige, hellviolett gestreift. Nabel weiß, ocker gerandet. |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| P-12-03-512 | Stangenbohne | 'Chinesische Wachtelbohne' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Reiserbohne, 1 m hoch, Blüte blaßviolett, Frucht grün, fädig; Samen halb weiß, halb rot mit roten Kreisflecken, Nabel weiß, rot gerandet. |
| P-12-03-517 | Stangenbohne | Fadenlose Stangenbohne 7-A | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fadenlose Sorte mit schlanken Hülsen, kleinen, dunkelbraunen bis schwarzen Samen, Nabel weiß. |
| P-12-03-520 | Stangenbohne | 'Ohne Namen' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fadenlose Stangenbohne, violettsamig. Samen violett, Nabel weiß, ocker gerandet. |
| P-12-03-524 | Stangenbohne | 'Fasülye (3)' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Von türkischen Immigranten mitgebrachte Sorte. Fadenlos, Samen nierenförmig, Grundfarbe beige, rot gefleckt. Nabel weiß, ocker gerandet. |
| P-12-03-526 | Stangenbohne | 'Grandilla' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fadenlose Stangenbohne. Samen mittelgroß, grau, Nabel weiß. |
| P-12-03-528 | Stangenbohne | Herkunft: Ecuador | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fädige Sorte, Samen schwarz, Nabel weiß. Halbwilde Form mit aufspringenden Hülsen. |
| P-12-03-532 | Stangenbohne | 'Lange Bohne' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fädige Sorte, Samen groß, beige, weinrote Streifen und Flecken, Nabel weiß, ocker gerandet. |
| P-12-03-534 | Stangenbohne | 'Mösch-Eier (fadenlos)' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fadenlose Trockenbohne. Samen groß, beige, kirschrote Streifen und Flecken. Nabel weiß, ocker gerandet. |
| P-12-03-535 | Stangenbohne | 'Mösch-Eier (fädig)' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fädige Trockenbohne. Samen groß, beige, dunkel-weinrote Streifen und Flecken. Nabel weiß, ocker gerandet. |
| P-12-03-538 | Stangenbohne | 'Ortenauer Weiße' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fädige, weißsamige Stangenbohne. |
| P-12-03-547 | Stangenbohne | Schwarzsamige Einloch-Reiserbohne | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Einloch-Reiserbohne. Fadenlose Sorte, Samen schwarz, Nabel weiß. |
| P-12-03-554 | Stangenbohne | Herkunft: Türkei | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fadenlose Sorte. Samen halb weiß, halb ocker, stark purpur gesprenkelt; Nabel weiß. |
| P-12-03-558 | Stangenbohne | Herkunft: Türkei | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fadenlose Schwertbohne. Samen mittelgroß, rundlich, flach, etwas runzelig, rosa-braun. Nabel weiß mit braunem Rand. |
| P-12-03-577 | Stangenbohne | Herkunft: Türkei | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fadenlos, Samen grau-braun, mit schwarzen Zebrastrifen und -flecken; Nabel weiß, braun gerandet. |
| P-12-03-586 | Stangenbohne | 'Weinländerin dunkel' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Pflanze 1m hoch, blüht sehr spät, violett. Frucht grün, violett gestreift, fadenlos. Samen kaffeebraun, Nabel weiß. |
| P-12-03-587 | Stangenbohne | 'Weinländerin hell' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Pflanze 1 m hoch, blüht sehr spät, violett. Frucht grün, violett gestreift, fadenlos. Samen beige, grau und dunkelviolet gestreift. Nabel weiß, Rand ocker. |

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------|--|
| P-12-03-595 | Stangenbohne | 'Kaiser Friedrich' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Alte, deutsche, sehr ertragreiche fadenlose Butterbohne mit breiten, flachen, gelb-rosa Hülsen. Blüten rosa-violett, Samen lilablau, später braunblau. Mittelspät. |
| P-12-03-597 | Stangenbohne | 'Quaratini' | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Ertragreich. Samen weiß mit weißem Nabel und weißer Umrandung |
| P-12-03-598 | Stangenbohne | Herkunft: Rumänien | Phaseolus vulgaris L. | var. vulgaris | Fädige Stangenbohne aus Rumänien mit der ein traditionelles rumänisches Gericht hergestellt wird. Beige Grundfarbe mit dunkelbeigen Streifen und Flecken, Nabel ocker gerandet |

FEUERBOHNEN

| | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--|
| P-12-01-001 | Busch-Feuer-Bohne | 'Hammonds Dwarf Scarlet' | Phaseolus coccineus L. | var. rubronanus Bailey | Busch-Feuerbohne, Blüte rot, Samen violett-rot mit schwarzen Streifen. |
| P-12-01-009 | Feuerbohne | ohne Namen | Phaseolus coccineus L. | | Seit 1956 in Schweighausen auf Bauernhof im Anbau. Weiße und lila Bohnen gemischt. Von Ehefrau mitgebracht (erhalten von ihrer Mutter, bereits vor dem Krieg). |

ERBSEN

| | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----------------------|---|--|
| P-15-01-007 | Winter-Erbse | 'Sima' | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum | Niedrige Sorte mit reduziertem Laub, auch als Sommerung geeignet. Samen klein, rund, gelb-grün, Nabel unauffällig. |
| P-15-01-008 | Erbse | Herkunft: Türkei | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum | Buntblühend. Samen groß, runzlig, braun-grün, schwarz gepunktet. Nabel unauffällig. |
| P-15-01-009 | Erbse | Herkunft: Türkei | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum | Buntblühend. Samen mittelgroß, etwas eingedellt, braun. Nabel schwarz. |
| P-15-01-010 | Erbse | Herkunft: Türkei | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum | Buntblühend. Samen mittelgroß, eingedellt bis etwas runzlig, bräunlich, dunkel punktiert. Nabel unauffällig. |
| P-15-01-011 | Erbse | Türkische Erbse 2C (A-D) | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum | Türkische Erbse 2C (A-D). Violett blühend. Samen bräunlich-grün, dunkel punktiert, selten schwarz. Nabel braun. |
| P-15-01-012 | Erbse | Türkische Erbse 2D (A-D) | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum | Türkische Erbse 2D (A-D). Buntblühend. Samen bräunlich-grün, dunkel punktiert, selten schwarz. Nabel braun. |
| P-15-01-021 | Winter-Erbse | 'Württembergische Wintererbse' | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum convar. speciosum (Dierb.) Alef. | Buntblühend. Samen klein, rund, braun. Nabel unauffällig. |
| P-15-01-023 | Futter-Erbse | 'Hohenheimer Rosablühende' | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum convar. speciosum (Dierb.) Alef. var. grandigriseum Körn | Rosablühende Futtererbse. Samen rund, braun, Nabel dunkler. |
| P-15-01-024 | Futter-Erbse | 'Späth's Hohenheimer Rosablättrige Futter' | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum convar. speciosum (Dierb.) Alef. var. grandigriseum Körn | Buntblühende Futtererbse. Samen rund, braun, Nabel dunkler. |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|---|---|
| P-15-01-025 | Erbse | 'Lettische Braunerbse' | Pisum sativum L. s.l. | ssp. sativum | Delikate Trockenerbse. Bis zu 2m hoch, gute Stütze erforderlich. Seit 2005 erfolgreich in Weil am Rhein in Kultur |
| SOJABOHNEN | | | | | |
| G-03-01-003 | Sojabohne | Soja S. ON-5 | Glycine max (L.) Merr. | convar. intermedia (Tupik.) Lehm. | Samen rundlich, gelb, zum Nabel braun gefleckt, selten ganz braun. |
| G-03-01-005 | Sojabohne | Rastätter Schwarze | Glycine max (L.) Merr. | convar. max var. albo-ater (Tupik.) Lehm. | 'Rastätter Schwarze'. Samen schwarz, innen gelb. |
| G-03-01-006 | Sojabohne | | Glycine max (L.) Merr. | convar. max var. lanceolata (Skvortz.) Lehm. | Samen groß, rund, gelb bis graugelb. Nabel schwarz. |
| G-03-01-009 | Sojabohne | 'Schwarze Poppelsdorfer' | Glycine max (L.) Merr. | convar. max var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm. | Samen schwarz, innen hellgelb. Niedrig wachsend. |
| G-03-01-010 | Sojabohne | 'Schwarze Poppelsdorfer' | Glycine max (L.) Merr. | convar. max var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm. | Samen schwarz, innen hellgelb. Hochwachsend |
| G-03-01-012 | Sojabohne | 'Georgian' | Glycine max (L.) Merr. | convar. max var. tarda (Enk.) Lehm. | Samen rundlich, gelb-schwarz gefleckt. |
| G-03-01-013 | Sojabohne | 'Grüne aus China' | Glycine max (L.) Merr. | convar. max var. virescens-virescens (Skvortz.) Lehm. | Samen groß und rund, grün, innen gelbgrün. Nabel braun. |
| G-03-01-014 | Sojabohne | 'Czarna S. W. H. N.' | Glycine max (L.) Merr. | var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm. | Samen schwarz, innen gelb. |
| G-03-01-018 | Sojabohne | 'Lotus' | Glycine max (L.) Merr. | | Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb. |
| G-03-01-019 | Sojabohne | 'Primus' | Glycine max (L.) Merr. | | Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb, teils braun gefleckt. |
| G-03-01-023 | Sojabohne | Soja S. ON-3b | Glycine max (L.) Merr. | | Samen grün-schwarz, auch innen grün. |
| G-03-01-026 | Sojabohne | Soja S. ON-13 | Glycine max (L.) Merr. | | Samen gelb-grau, etwas schwarz-grau streifig, Nabel braun. |
| G-03-01-027 | Sojabohne | Soja-ON-8 | Glycine max (L.) Merr. | | Samen gelb, Nabel braun. |
| G-03-01-030 | Sojabohne | 'Tiroler Kaffee' | Glycine max (L.) Merr. | | Samen grün, selten etwas schwarz gestreift, auch innen grün. |
| G-03-01-031 | Edamame, Sojabohne | 'Summer Shell' | Glycine max (L.) Merr. | | Mittelfrühe unreif geerntete grüne Sojabohne aus Japan. Sie werden am Stiel gekocht. Nur die im Inneren verborgenen Bohnen werden gegessen. |

| | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|------------------------|--|--|
| G-03-01-032 | Edamame, Sojabohne | 'Green Shell' | Glycine max (L.) Merr. | | Frühe unreif geerntete grüne Sojabohne aus Japan. Sie werden am Stiel gekocht. Nur die im Inneren verborgenen Bohnen werden gegessen. |
| G-03-01-033 | Sojabohne | ohne Namen | Glycine max (L.) Merr. | | Samen hellbeige, teils mit braun, vom Nabel ausgehenden Streifen, sehr ertragreich, Sorte unbekannt, aus Erwerbsanbau auf Bodenseminar 2021 erhalten |

LINSEN

| | | | | | |
|-------------|-------|---------------------|-----------------------|--|---|
| L-05-01-005 | Linse | 'Späths Alblinse 1' | Lens culinaris Medik. | | Wiederentdeckte alte Sorte. Samen klein, hellgrün-beige, einzelne Körner sind getupft oder marmoriert. Festkochend mit ausgeprägt nussig-linsiger Note. |
|-------------|-------|---------------------|-----------------------|--|---|

RARITÄTEN

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| V-05-01-001 | Mung-Bohne | ohne Namen | Vigna radiata (L.) Wilczek | | Wärmeliebende Pflanze mit kleinen, grünen Samen. |
| V-05-02-001 | Angola- oder Katjang-Bohne | 'Corrientes' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. cylindrica (L.) Verdc. | Wärmeliebende, etwas rankende Sorte mit kleinen, rotbraunen Samen. Hülsen bis ca. 20 cm lang schlank, hell. |
| V-05-02-002 | Angola- oder Katjang-Bohne | 'Graubraune' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. cylindrica (L.) Verdc. | Wärmebedürftige, spät reifende Sorte mit hellbraunen Samen, Nabel braun. Breitwüchsig, kaum rankend. |
| V-05-02-005 | Spargelbohne | 'Kilometer-Bohne' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. sesquipedalis (L.) Verdc. | Wärmeliebende Stangenbohnsorte mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 60 cm lang. |
| V-05-02-006 | Augen-Bohne | 'Black Eye Pea' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. unguiculata | Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte mit schwarzem Nabelfleck. Hülsen ca.15 cm lang. Alle Pflanzenteile sind als Gemüse verwendbar. |
| V-05-02-007 | Augen-Bohne | Herkunft: Burma | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. unguiculata | Wärmeliebende, schwarzsamige Sorte. Hülsen violett, reif hell, bis ca. 30 cm lang. |
| V-05-02-008 | Augen-Bohne | 'Carrapichio' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. unguiculata | Wärmeliebende Sorte mit hellbraunen Samen und braunem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang. |
| V-05-02-011 | Augen-Bohne | 'Pink Eye Pea' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. unguiculata | Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, weiß mit rotbraunem Nabelfleck. Hülsen violett, ca. 10 cm lang. Alle Pflanzenteile sind als Gemüse verwendbar. |
| V-05-02-012 | Angola-Bohne | ohne Namen | Vigna unguiculata (L.) Walp. | | Auch Katjang-Bohne genannt. Wärmeliebende Buschbohne mit hellbraunen Samen. Hülsen ca 15 cm, schlank, etwas gebogen. Blätter und junge Hülsen sind als Gemüse verwendbar. |
| V-05-02-014 | Angola-Bohne | 'Posthörnchen' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | | Auch Katjang-Bohne genannt. Wärmeliebende Buschbohne mit rotbraunen Samen. Hülsen ca 15 cm lang, schlank, etwas gebogen. |
| V-05-02-015 | Spargelbohne | 'Peitschen-Bohne Marx' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. sesquipedalis (L.) Verdc. | Wärmeliebende Stangenbohnsorte mit schwarzen Samen. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang. |
| V-05-02-016 | Spargelbohne | 'Spaghetti-Bohne' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. sesquipedalis (L.) Verdc. | Wärmeliebende Stangenbohnsorte mit schwarzen Samen. Hülsen hell, bis ca. 20 cm lang. |

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------|------------------|--|
| V-05-02-017 | Augen-Bohne | 'Augenbohne Linz' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. unguiculata | Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen weiß bis rosa, mit schwarzem Nabelfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang. |
| V-05-02-018 | Augen-Bohne | 'Blue Goose' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. unguiculata | Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen weiß bis rosa, schwarz gesprenkelt, mit braunem Nabelfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang. |
| V-05-02-019 | Augen-Bohne | 'Fagiolino Dolico Veneto' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. unguiculata | Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen klein, weiß mit schwarzem Augenfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang. |
| V-05-02-020 | Augen-Bohne | Herkunft: Pakistan | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. unguiculata | Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen klein, blaß braun, mit braunem Augenfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang. |
| V-05-02-021 | Augen-Bohne | 'Vigna Tansania' | Vigna unguiculata (L.) Walp. | ssp. unguiculata | Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte, Samen klein, blaß braun-rosa, mit braunem Augenfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang. |

KOHLGEWÄCHSE

| | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---|
| B-05-05-006 | Braun-Kohl | 'Krasnaja Kurcavaja Vysokaja' | Brassica oleracea L. | convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. | Mittelhohe, nicht ganz standfeste, nur in milden Lagen überwinternde dunkelrote Sorte. |
| B-05-05-012 | Wirsing-Kohl | 'Vertus 2' | Brassica oleracea L. | convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. | Herbstwirsing mit großen, leicht plattrunden Köpfen und blaugrünen Außenblättern. Milder Geschmack. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte. |
| B-05-05-013 | Tausendkopf-Kohl | | Brassica oleracea L. | convar. fruticosa (Metzg.) Alef. var. ramosa DC. | Panaschiertes Laub, auch rein grüner Sport. Jeweils nur Stecklinge. |
| B-05-06-004 | Brokkoli di rapa; Ruvo | 'Novantina' | Brassica rapa L. em. Metzg. | ssp. oleifera (DC.) Metzg. | Ähnlich Stielmus und Rübsen: Sproß, Blätter und Blütenknospen als Gemüse. |

HEIL-, WÜRZKRÄUTER UND FÄRBEPFLANZEN

FÄRBEPFLANZEN

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|---|
| I-03-01-001 | Garten-Springkraut, Balsamine | | Impatiens balsamina L. | | Einjährige Gemüse, Heil-, Färbe- und Zierpflanze mit roten Blüten. |
| R-10-01-001 | Färber-Krapp | | Rubia tinctorum L. | | Traditionelle Färbepflanze, die Wurzel färbt rot. Auch vegetativ vermehrbar. Saatgut oder Ausläufer nach Verfügbarkeit. |

HEILKRÄUTER

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| A-08-07-001 | Bischofskraut | | Ammi visnaga L. | | Auch Zahnstocher-Knorpelmöhre; Zier- und Heilpflanze, etwa 1-2m hoch, möhrenähnlich, krampflösende und herzkranzgefäßerweiternde Wirkung |
| A-09-01-001 | Bertram (Bertramwurzel) | | Anacyclus officinarum Hayne | | Offenbar Rückzüchtung des um 1900 ausgestorbenen Deutschen Bertrams, Heilpflanze. |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|---|---|--|
| A-19-01-001 | Eberraute | | Artemisia abrotanum L. | | Heil- und Würzpflanze, auch als Zierpflanze für Beeteinfassungen, Trocken-, Stein- und Steppengärten geeignet. Stecklinge bzw. Ableger im Herbst. |
| A-19-04-001 | Japanisches Moxakraut | | Artemisia princeps Pampan. | | Hohe, ausdauernde, stark duftende Art, die sich auch als Sichtschutz eignet. Ausläufer im Herbst nach Bestellung. Räucherkraut, für Moxastäbchen. |
| C-09-10-001 | Herzsame, Ballonrebe | | Cardiospermum halicacabum L. | | Rankende Zier- und Heilpflanze mit ballonartigen Früchten. Das 'Cortison der Natur' völlig Nebenwirkungsfrei hilft es bei entzündlichen und allergischen Reaktionen der Haut sowie bei Verbrennungen und Mückenstichen |
| C-19-01-001 | Balsamkraut, Marienkraut | | Chrysanthemum balsamita (L.) Baill. | | Ausdauernde Duft-, Heil- und Würzpflanze. |
| F-01-01-004 | Staudenfenchel | | Foeniculum vulgare Mill. | ssp. vulgare var. dulce (Mill.) Thell. | Imposante Pflanzen mit reichlich Blüten und Samen. Für Tee und zum Würzen. Wertvoll für Insekten und Vögel. |
| G-05-01-001 | Jiaogulan | | Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino | | Einjährige bis ausdauernde Heilpflanze, die ähnlich wie Ginseng wirkt. Die frischen Blätter werden als Salat oder spinatähnlich verwendet. Sowohl aus den getrockneten, als auch den frischen Blättern kann Tee zubereitet werden. |
| L-01-03-001 | Kompaß-Lattich | Wildsalat | Lactuca serriola L. | f. integrifolia (Gray) S. D. Prince et R. N. Carter | Wildsalat. Basal verzweigter Sproß, lange, ungeteilte Blätter, die jungen kräftig rot. Der bittere Milchsaft ist giftig. |
| M-04-01-001 | Echte Kamille | | Matricaria recutita L. | | Aromatische, einjährige Heilpflanze, Ackerunkraut. |
| M-15-01-001 | Bittergurke | Herkunft: Pakistan | Momordica charantia L. | | Auch Bittermelone, Balsambirne. Bis 5m hoch rankende Heil- und Gemüsepflanze, sehr bitter. Die Früchte werden unreif geerntet. |
| M-15-01-002 | Bittergurke | Herkunft: Thailand | Momordica charantia L. | | Auch Bittermelone, Balsambirne. Bis 5m hoch rankende Heil- und Gemüsepflanze, sehr bitter. Die Früchte werden unreif geerntet. |
| N-07-01-001 | Bauern-Tabak | | Nicotiana rustica | | Auch Veilchentabak genannt. Sehr robuste Sorte, für Direktsaat geeignet. Geeignet für Pflanzenschutz, sehr giftig! |
| N-07-02-001 | Tabak | 'Virginia' | Nicotiana tabacum | | Robuster Zigaretten tabak, der auch in trockenen Jahren gedeiht, sehr schöne rosa Blütenstände, sehr giftig! |
| P-10-01-001 | Echter oder Arznei-Haarstrang | | Peucedanum officinale L. | | Ausdauernd. Alte Räucherpflanze mit sehr feinem, dekorativem Laub. |
| R-09-01-001 | Weinraute | | Ruta graveolens L. | | Alte Würz-, Heil- und Duftpflanze. Ausdauernder 40-80cm hoher Halbstrauch. Mäßig winterhart, Frostschutz. Evtl. allergieauslösend und phototoxisch. |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| S-11-01-001 | Mariendistel | | Silybum marianum (L.) Gaertn. | | Die Leber schützende und stärkende Heilpflanze, auch Bienenweide. |
| WÜRZKRÄUTER | | | | | |
| A-11-01-003 | Garten-Dill | Herkunft: Kirgistan | Anethum graveolens L. | var. hortorum Alef. | Von Migranten aus Kirgistan mitgebracht. |
| A-13-01-001 | Garten-Kerbel | | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | | Beliebtes Würzkaut |
| A-19-03-001 | Estragon | | Artemisia dracunculus L. | | Mehrere Sorten, Ableger auf Anfrage. |
| C-10-01-001 | Kümmel | | Carum carvi L. | var. annuum hort. | einjährig. Im ersten Jahr blühender und fruchtender Kümmel, weniger aromatisch als der zweijährige. |
| C-30-01-002 | Koriander | Herkunft: Iran | Coriandrum sativum L. | | Kleinsamige Sorte. |
| C-30-01-003 | Koriander | ohne Namen | Coriandrum sativum L. | | Kleinsamiger Koriander. |
| C-30-01-004 | Koriander | Herkunft: Marokko | Coriandrum sativum L. | | Blattkoriander marokkanischer Immigranten. |
| C-30-01-005 | Koriander | 'Santo' | Coriandrum sativum L. | | Schnitt- oder Blattkoriander. Reife und unreife Samen auch als Gewürz. |
| C-33-01-001 | Mitsuba, Japanische Petersilie | | Cryptotaenia canadensis (L.) DC. | ssp. japonica (Hassk.) Hand.-Mazz. | Meist einjährig gezogene Würzpflanze aus Japan. Verwendet werden die frischen Mitsuba-Blätter samt Stielen in Suppen und anderen Gerichten. |
| D-07-01-001 | Schmalblättriger Doppelsame | | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | | Auch Wilde Rauke. Sie wird unter dem Namen Rucola gehandelt und als Salat oder Gewürz verwendet. |
| E-04-01-001 | Salatrauke, Rukola | | Eruca sativa Mill. | | Einjährige Würzpflanze mit einem sehr intensiven, würzig-herben und leicht scharfen Geschmack. Ältere Blätter können bitter schmecken. |
| L-07-03-002 | Garten-Kresse | 'Grüne Krause' | Lepidium sativum L. | var. crispum (Medik.) DC. | Geschlitzblättrige Sorte. Geerntet werden die Rosetten vor dem Schossen. |
| L-07-03-004 | Garten-Kresse | Herkunft: Iran | Lepidium sativum L. | | Geerntet werden die ganzen Pflanzen vor der Blüte. |
| M-01-01-001 | Majoran | Asiatischer | Majorana hortensis Moench | | Asiatischer Majoran. Heil- und Würzpflanze. Buschig wachsendes Kraut, nicht frosthart. Ernte kurz vor der Blüte. Liebt sonnigen Standort. |
| M-01-01-002 | Majoran | Herkunft: Frankreich | Majorana hortensis Moench | | Französischer Majoran . Französische Sorte. Heil- und Würzpflanze. Buschig wachsendes Kraut, nicht frosthart. Ernte kurz vor der Blüte. Liebt sonnigen Standort. |
| O-01-01-001 | Basilikum | 'Kasa kasa' | Ocimum basilicum L. | | Grünblättrige, aromatische Sorte mit fleischig glänzenden Blättern und starkem Aroma. |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| O-01-01-003 | Basilikum | 'Piccolino' | Ocimum basilicum L. | | Grünes Bubikopf-Basilikum. |
| O-01-02-001 | Tulsi | | Ocimum tenuiflorum L. | | Indisches Basilikum: die ‚Königin der Kräuter‘ wächst in Indien als heilige Pflanze im Garten eines jeden Tempels und Hauses. Meist als Tee getrunken, mit vielfältigen Heilwirkungen. Vorkultur, Lichtkeimer! |
| R-02-02-002 | Schlangen-Rettich | | Raphanus sativus L. | convar. caudatus (L. f.) Pistrick | Auch Rattenschwanzrettich. Die jungen knackigen bis 15cm langen Samenschoten mit intensiven Rettichgeschmack können roh oder gedünstet gegessen werden. Wird 80cm hoch. Stütze nötig. |
| R-06-01-001 | Rosmarin | | Rosmarinus officinalis L. | | Duft-, Heil- und Gewürzpflanze. |
| S-04-01-003 | Echtes Bohnenkraut | | Satureja hortensis L. | | Aromatisches einjähriges Bohnenkraut. |
| T-01-01-001 | Huacatay | | Tagetes minuta L. | | Über 1m hoch wachsende Tagetes, die in den Anden als Würzpflanze genutzt wird. Betörender Duft, hübsche kleine Blüten |
| T-09-00-001 | Trigonella | | Trigonella sp. | | Als Gewürz benutzt, Art muß nachbestimmt werden. |
| T-09-01-001 | Schabzigerklee, Brotklee | | Trigonella caerulea (L.) Sér. | | Auch Brotklee. Hellblau blühende Art. Verwendet wird das getrocknete, fein gemahlene Kraut als Gewürz für Brot und Käse. |
| T-09-02-001 | Kasuri Methi | | Trigonella corniculata (L.) L. | | Indisches Gewürz und Kochgemüse. |

KÜRBISGEWÄCHSE

GURKEN

| | | | | | |
|-------------|-------|--------------------------|--------------------|--|--|
| C-34-03-002 | Gurke | Herkunft: Eichstetten | Cucumis sativus L. | | Dickfleischige Sorte, traditionell für süßsaure Gurken verwendet. |
| C-34-03-004 | Gurke | 'Pappelchen' | Cucumis sativus L. | | Eiförmige, kleine Früchte. Reif braun. |
| C-34-03-005 | Gurke | Herkunft: Russland | Cucumis sativus L. | | Russische Landgurke; weißstachelig, Stielende teils bitter. |
| C-34-03-006 | Gurke | Herkunft: Türkei | Cucumis sativus L. | | Glattschalige, kleine, schlanke Vespergurke aus der Türkei. |
| C-34-03-007 | Gurke | Herkunft: Indien | Cucumis sativus L. | | Indische Gurke. Längliche, aromatische Früchte mit brauner, rissiger Schale. |
| C-34-03-008 | Gurke | 'Zitronengurke' | Cucumis sativus L. | | gelbe, runde Früchte mit 5 Fruchtblättern |

KALEBASSEN

| | | | | | |
|-------------|-----------|------------------------|---|--------------------------------------|---|
| L-02-01-002 | Kalebasse | Herkunft: Italien | Lagenaria siceraria (Molina) Standl. | ssp. asiatica (Kobayakova) Heiser | Schlanke, über 1 m lang werdende Früchte, die in unreifem Zustand roh oder gekocht gegessen werden. |
| L-02-01-003 | Kalebasse | 'Apple' | Lagenaria siceraria (Molina) Standl. | | Große, grüne, sehr dekorative apfelförmige Früchte. |
| L-02-01-008 | Kalebasse | 'Korsischer Teller' | Lagenaria siceraria (Molina) Standl. | | Flachrunde Früchte, die sich zur Herstellung dekorativer Gefäße eignen, bitter! |
| L-02-01-010 | Kalebasse | | Lagenaria siceraria (Molina) Standl. | ssp. asiatica (Kobayakova) Heiser | Landsorte. Walzenförmige, essbare Früchte. |

KÜRBIS

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| C-35-01-001 | Feigenblatt- Kürbis | | Cucurbita ficifolia Bouché | | Früchte sehr hart, Fleisch weiß, Samen schwarz. In Südeuropa zu "Engelhaar-Marmelade" eingekocht. |
| C-35-02-001 | Riesen-Kürbis | ohne Namen | Cucurbita maxima Duch. ex Lam. | convar. maxima | Rankende Landsorte, von jugoslawischen Immigranten kultiviert. Früchte mittelgroß bis groß, orange-rot oder grau-blau, Samen gelb. |
| C-35-02-005 | Riesen-Kürbis Hokkaido | 'Red Kuri' | Cucurbita maxima Duch. ex Lam. | convar. maxima | Breitrunder, orangefarbener Kürbis mit gelbem Fleisch. Feiner nussartiger Geschmack, muss vor dem Verzehr nicht geschält werden. 1,2-1,5kg. |
| C-35-03-002 | Moschus-Kürbis | ohne Namen | Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir. | | Stark rankende Sorte mit großen, keulenförmigen Früchten, die grün bleiben. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß. |
| C-35-03-003 | Moschus-Kürbis | ohne Namen | Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir. | | Stark rankende Sorte mit großen, eiförmigen Früchten. Grün mit weißer oder gelblicher Zeichnung. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß. |
| C-35-03-004 | Trombolino/ Schlangenkürbis | 'Trombetta d'Albenga' | Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir. | | Rankender Moschuskürbis, bis 1 m lange, schlanke, beige Früchte mit verdicktem Ende und gelborangen Fruchtfleisch. Jung, wie Zucchini. Ausgereift gut lagerfähig. |
| C-35-03-005 | Moschus-Kürbis | 'Violina di Mantova' | Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir. | convar. moschata | Violinenförmige, 3-4 kg schwere, leicht gerippte Früchte. Fleisch sehr fein, nussig-fruchtig, süß, cremig, fest und kräftig orange. Gut zum Füllen von Tortellini |
| C-35-04-001 | Zucchini | Herkunft: Eichstetten | Cucurbita pepo L. | convar. giromontiina Greb. var. giromontia Alef. s.l. | Eichstetten. Grüne Zucchini, ohne oder mit kurzen Ranken. |
| C-35-04-002 | Öl-Kürbis | Rankenloser Ölkürbis | Cucurbita pepo L. | convar. giromontiina Greb. var. oleifera Pietsch | Rankenlose Sorte. Kleinfrüchtige Sorte mit kurzen, walzenförmigen Früchten, grün, teils gelb gestreift. Samen klein. |

| | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------|-------------------|---|---|
| C-35-04-004 | Öl-Kürbis | Rankender Ölkürbis | Cucurbita pepo L. | convar. pepo var. styriaca Greb. | Rankend, großfrüchtig und großsamig. |
| C-35-04-006 | Zucchini | 'Costata Romanesco' | Cucurbita pepo L. | convar. giromontiina Greb. var. giromontia Alef. s.l. | Grün mit hellen Rippen, länglich. Ausgezeichneter Geschmack, hellgelbes Fleisch. Auch größer essbar. |
| C-35-04-007 | Zucchini | 'Black Beauty' | Cucurbita pepo L. | convar. giromontiina Greb. var. giromontia Alef. s.l. | Ertragreiche Sorte mit variierenden grünen bis dunkelgrünen Früchten. Sehr schmackhaft mit guter Konsistenz |

MELONEN

| | | | | | |
|-------------|------------------|--------------------------------|---|---|--|
| C-22-01-001 | Wasser-Melone | 'Brot von Babylon' | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | ssp. lanatus var. citroides (Bailey) Mansf. | Sehr große, nicht süße Wassermelone, weißfleischig, Samen bläulich. |
| C-34-01-001 | Charantia-Melone | ohne Namen | Cucumis melo L. | ssp. melo var. cantalupensis Naud. | Nachbau aus dem Handel, süß und aromatisch; für Gewächshaus, Kasten oder Tunnel. |
| C-34-01-002 | Zucker-Melone | 'Noire des Carmes' | Cucumis melo L. | var. cantalupensis Naud. | Wenig Aroma, nicht süß, orange Fruchtfleisch. |
| C-34-01-003 | Armenische Gurke | 'Concombre very long ameliore' | Cucumis melo L. | var. flexuosus L. | Melone, deren längliche, nicht süße Früchte jung oder reif gegessen werden. Für Gewächshaus oder Tunnel. |
| C-34-01-004 | Armenische Gurke | | Cucumis melo L. | var. flexuosus L. | |
| C-34-01-005 | Zucker-Melone | Herkunft: Kasachstan | Cucumis melo L. | var. inodorus Jacquin | Gelb-grün, süß, wenig Aroma; für Gewächshaus oder Tunnel! |
| C-34-01-006 | Zucker-Melone | 'Nutmeg' | Cucumis melo L. | var. reticulatus Séringe | Netzmelone mit orangem Fruchtfleisch. Alte Sorte, die angeblich auch in kühlerem Klima fruchtet. |
| C-34-01-007 | Zucker- Melone | 'Petit Gris de Rennes' | Cucumis melo L. | | Bedingt freilandtauglich, besser in Kasten, Tunnel oder Gewächshaus. |
| C-34-01-008 | Zucker-Melone | | Cucumis melo L. | | gelbe, runde, relativ große, zum Teil leicht benetzte Früchte. Fleisch gelb-orange, saftig, süß, aromatisch. Freilandtauglich. |
| C-34-01-009 | Zucker-Melone | 'Kajari' | Cucumis melo L. | | Alte Sorte aus Indien mit frühreifen, süß-saftigen Früchten mit grün-rosa Fruchtfleisch und grün-oranger Schale. Sehr dekorativ und schmackhaft. |

MAIS

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|--|
| Z-01-01-004 | Mais | ohne Namen | Zea mays L. | convar. aorista Greb. | Zwischen Hart- und Zahnmais stehende türkische Herkunft mit mittelgroßem, kompaktem, gelbem Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot. |
| Z-01-01-007 | Zahn-Mais | 'Oaxacan Green' | Zea mays L. | convar. dentiformis Körn. | Grüner Zahnmais. Lieschen ocker-weiß, Spindel rot oder weiß. |

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------|--|---|
| Z-01-01-008 | Zahn-Mais | 'Zahnmais Haiden' | Zea mays L. | convar. dentiformis Körn. var. flavorubra Körn. | Aus Österreich stammender Zahnmais mit flachem, rotem Korn und orangegelber Kunde. Spindel rund 15 cm lang, weiß. |
| Z-01-01-009 | Hart-Mais | 'Rot-Weiß-Rot' | Zea mays L. | convar. mays | Mosaik-Hartmais mit weißer Spindel und weiß-rot gestreiftem Korn. |
| Z-01-01-010 | Hart-Mais | ohne Namen | Zea mays L. | convar. mays var. alba Alef. | Relativ weicher Hartmais, weißkörnige, selten etwas gelb. Sorte aus Österreich. |
| Z-01-01-011 | Hart-Mais | 'Weißer Ribisch' | Zea mays L. | convar. mays var. alba Alef. | Relativ weicher Hartmais, weißkörnige Landsorte aus Niederösterreich mit großen, gedrungenen, etwas kegeligen Kolben. |
| Z-01-01-012 | Zier-Mais | ohne Namen | Zea mays L. | convar. mays var. japonica hort. | Dekorativer Hartmais mit panaschiertem Laub, spät reifend, dunkelrotes Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot. |
| Z-01-01-016 | Puff-Mais | 'Kukuruz Kokicar Crveni' | Zea mays L. | convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef. | Puffmais mit kleinem, kompaktem, teils zugespitztem, rotem Korn. Spindel gut 15 cm lang, rot. |
| Z-01-01-017 | Puff-Mais | 'Long Pop' | Zea mays L. | convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef. | Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, gelbes oder blaues Korn. Kolben weiß-blau (2019). |
| Z-01-01-018 | Puff-Mais | 'Long Pop' | Zea mays L. | convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef. | Perl-Puffmais, schlanke Kolben, mit weißen Lieschen und Spelzen. Korn rund, klein, milchkaffeebraun. (2007). |
| Z-01-01-019 | Puff-Mais | 'Long Pop' | Zea mays L. | convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef. | Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, schwärzlich-rötliches Korn (2007). |
| Z-01-01-020 | Puff-Mais | ohne Namen | Zea mays L. | convar. microsperma Körn. var. oryzoides Körn. | Reis-Puffmais mit roter oder weißer Spindel, gedrungenem, gelegentlich abgeflachtem Kolben und mittelgroßem, zugespitztem, weißem Korn. |
| Z-01-01-022 | Zucker-Mais | 'Jade Green' | Zea mays L. | convar. saccharata Körn. | Blauer Zuckermais. |
| Z-01-01-029 | Wachs-Mais | ohne Namen | Zea mays L. | convar. ceratina (Kule shov) Greb. | Gelbkörniger Wachsmais. |
| Z-01-01-030 | Spelz-Mais | ohne Namen | Zea mays L. | var. tunicata St. Hil. | Roter Spelzmais. Lieschen und Spindel rot, kleine, etwas zugespitzte, rotbraune Körner. |
| Z-01-01-034 | Hart-Mais | 'Bariole Mochete' | Zea mays L. | convar. mays | Mehrfarbiger Hartmais mit gefleckten Körnern |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| Z-01-01-035 | Hart-Mais | 'Hopi' | Zea mays L. | convar. mays | 30 cm lange Kolben, Körner grauschwarz, Spindel weiß. |
| Z-01-01-036 | Hart-Mais | ohne Namen | Zea mays L. | convar. microsperma Körn. | Kleinkörniger Hartmais mit leuchtend orange-gelber Kornfärbung, Kolben 15-20 cm, Spindelfarbe weiß. |
| Z-01-01-037 | Zucker-Mais | Blau-roter Zuckermais | Zea mays L. | convar. saccharata Körn. var. flavodulcis Körn. | Blau-roter Mosaik-Zuckermais, Spindel weiß. |
| Z-01-01-040 | Hart-Mais | 'Moucheté de Pérou' | Zea mays L. | convar. amylacea (Sturt.) Greb. | Peruanischer Tüpfelmais, Korn und Spindel weiß, graublau gefleckte Körner. |
| Z-01-01-041 | Hart-Mais | Schafzahnmais | Zea mays L. | convar. amylacea (Sturt.) Greb. | Mittelfrüher gelboranger wüchsiger, ertragreicher Schafzahnmais. |
| Z-01-01-042 | Hart-Mais | 'Domaca Bogovic' | Zea mays L. | convar. amylacea (Sturt.) Greb. | Ertragreicher Landmais, große Pflanzen, gelbe bis orange Körner, 1-2 Kolben pro Pflanze. |
| Z-01-01-044 | Puff-Mais | 'Rumänisches Popcorn' | Zea mays L. | convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef. | Dunkelroter Puffmais aus Rumänien, Spindel rot. |
| Z-01-01-045 | Zucker-Mais | 'Black Aztek' | Zea mays L. | convar. saccharata Körn. | Niedriger, früher Zuckermais, unreif mit hellblauem, reif mit fast schwarzem Korn. |
| Z-01-01-046 | verschiedene Varietäten | 'Hopi Blue' | Zea mays L. | divers | Homogen in Wuchs, Reifezeit, und Färbung, Kolben bestehen aus Körnern verschiedener Varietäten (Zuckermais, Zahnmais, Hartmais, Stärkemais), einheitlich dunkelblau. |
| Z-01-01-047 | Puff-Mais | 'Altai' | Zea mays L. | convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef. | Zierliche Pflänzchen, kaum 60 cm hoch, früh reifende, dekorative, weiße Kolben. |
| Z-01-01-048 | Puff-Mais | 'Long Pop' | Zea mays L. | convar. microsperma Körn. var. haematornis Alef. | Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, gelbes Korn. (2019). |
| Z-01-01-049 | Hart-Mais | Quarantaun | Zea mays L. | convar. amylacea (Sturt.) Greb. | Stein- oder Hartmais mit ocker-gelbem Korn und weißen Lieschen. Der Name weist auf die schnelle Reife hin. |
| Z-01-01-050 | Hart-Mais | ohne Namen | Zea mays L. | convar. amylacea (Sturt.) Greb. | Hartmais mit schönem geradem ca. 20 cm langem Kolben, rotem Korn und roter Spindel. 2021 spontan aus anderer Sorte gefallen, Nachbau einheitlich |
| Z-01-01-501 | Mais-Teosinte-Bastard | | Zea mays L. × Zea mexicana (Schrad.) Kuntze | | Heterogener, spät reifender Bestand, der teils in die Ausgangssippen spaltet, teils Eigenschaften beider trägt, Vorsicht beim Nachbau! Kleine oder größere, brüchige Kolben, teils ausfallende Körner. |

NACHTSCHATTENGEWÄCHSE

AUBERGINE

| | | | | | |
|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| S-14-02-001 | Afrikanische Aubergine | 'Gilo Brasil' | Solanum aethiopicum L. | | Ähnlich Aubergine, aber mit rundlichen, roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze. |
| S-14-02-003 | Afrikanische Aubergine | 'Red Dwarf' | Solanum aethiopicum L. | | Ähnlich Aubergine, aber mit rundlichen, roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze. |
| S-14-02-004 | Afrikanische Aubergine | 'Tombergine' | Solanum aethiopicum L. | | Ähnlich Aubergine, aber mit rundlichen, roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze. |
| S-14-05-001 | Aubergine | 'Skoutari' | Solanum melongena L. | | Große, dunkelviolet-weiß gestreifte Früchte. Kompakter Wuchs, sehr standfest. |
| S-14-05-002 | Aubergine | 'Slim Jim' | Solanum melongena L. | | etwa 10cm lange schmale lila Früchte, sehr früh reifend. Grün-violettes, dekoratives Laub, für Balkongärten geeignete Sorte. |
| S-14-05-004 | Aubergine | 'Tschechische Frühe' | Solanum melongena L. | | Violettfrüchtige Sorte, gedeiht auch im Freiland. |
| S-14-05-006 | Aubergine | 'Tsakoniki' | Solanum melongena L. | | Alte Sorte aus Griechenland mit zart-süßlichem Geschmack und feiner, zarter Schale. Klassisch birnenförmig zylindrische Früchte, 20-25cm lang. Weiß-lila gestreift mit festem Fleisch. Mittelspät, gut für Topf- und Kübelkultur, extrem guter Ertrag. |
| S-14-05-007 | Aubergine | 'Genko Enschev' | Solanum melongena L. | | dunkelviolet-weiß gestreifte Früchte, sehr ertragreich, eher niedriger Wuchs |

PAPRIKA mild

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------------|------------------------|--|---|
| C-09-00-004 | Paprika mild | 'Oro picante' | Capsicum annuum L. | | Süß, kann teilweise leicht scharf sein. Frühe Sorte, reift von hellgrün nach leuchtend orange. Länglich spitzstumpf, leicht gebuchtet, 8-13cm lang. In milden Lagen im Freiland kultivierbar. |
| C-09-00-005 | Paprika mild | 'Pilunca' | Capsicum annuum L. | | Süßer, großer Spitzpaprika, gebuchtet. Reift von grün auf tiefrot, festfleischig, sehr schmackhaft. In milden Lagen freilandtauglich, mittelspät. |
| C-09-00-006 | Paprika mild | 'Quadrato d'Asti Rosso' | Capsicum annuum L. | | Ertragreiche Gemüsepaprika aus Italien mit großen, länglich-blockigen Früchten, die von dunkelgrün auf rot abreifen. In milden Lagen freilandtauglich, mittelspät. |
| C-09-00-007 | Paprika mild | ohne Namen | Capsicum cf. annuum L. | | Roter dickfleischiger Blockpaprika. |
| C-09-00-008 | Paprika mild | 'Sigaretta ' | Capsicum annuum L. | | Leisten können leicht scharf sein. Schmale, mittellange, spiralförmige, rote Gewürzpaprika. Vollreif zum Einlegen, Trocknen und Mahlen. |
| C-09-00-011 | Paprika mild | Herkunft: Türkei | Capsicum annuum L. | | Mild. Leisten können leicht scharf sein. Hellrot-rote schlanke, schrumpelige, süße Gewürzpaprika. Ideal zur Pulverherstellung |

| | | | | | |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------------|--|---|
| C-09-00-017 | Paprika mild | 'Aji Dulce Amarillo' | Capsicum sp. | | Milder, süßer Habanero mit fruchtigem Habanero-Aroma, orange abreifend. Kerne und Rippen können scharf sein. |
| C-09-01-003 | Paprika mild | 'Roter Augsburg' | Capsicum annuum L. | | Süß-aromatische, robuste, frühreife, ca.12cm lange Spitzpaprika. Ertragreiche, alte deutsche Sorte. Gut für den Freilandanbau. |
| C-09-01-008 | Paprika mild | 'Croccanti rossi' | Capsicum annuum L. | | Milde reich tragende Sorte mit dunkelroten Früchten, die getrocknet und zu edelsüßem Paprikapulver verarbeitet werden können. |
| C-09-01-011 | Paprika mild | 'Eichstetter Roter Spiral' | Capsicum annuum L. | | Milder 15-20cm langer spiralförmiger, aromatischer Paprika, wohl aus Kreuzung mit anderen Sorten entstanden. Rot abreifend. Ideal zur Pulverherstellung |
| C-09-01-025 | Paprika mild | 'Merrimac Wonder' | Capsicum annuum L. | | Hellroter, paradeisförmiger Gemüsepaprika. Saftig, dünnfleischig, z.T. keine Samen. |
| C-09-01-026 | Paprika mild | Herkunft: Ungarn | Capsicum annuum L. | | Roter, wohlschmeckender Spitzpaprika aus dem Handel, Ungarn. 10-15 cm lange, 5-7 cm breite hängende Früchte mit stumpfer Spitze. |
| C-09-01-027 | Paprika mild | Herkunft: Kuba, Landsorte | Capsicum annuum L. | | Mild. Frühreifende Landsorte, mit roten 10-12 cm langen, schmalen, spitzen Früchten. Ertragreich, gut zum Trocknen und Mahlen für süßes Paprikapulver. |
| C-09-01-035 | Paprika mild | 'Paradeisfrüchtiger Roter' | Capsicum annuum L. | | Roter, sehr dickfleischiger, mittelgroßer Tomatenpaprika. Süß-aromatische, längs gefurchte, flachrunde Früchte. |
| C-09-01-040 | Paprika mild | 'Sweet Chocolate' | Capsicum annuum L. | | Kompakte, fast blockige, doch spitz zulaufende, mild-aromatische Frucht. Ab Mitte August dunkelbraun abreifend, innen rot. |
| C-09-01-043 | Paprika mild | 'Topgirl' | Capsicum annuum L. | | Roter, sehr wohlschmeckender, dickfleischiger, tomatenförmiger Gemüsepaprika. Kann teilweise leicht scharf sein. |
| C-09-01-050 | Paprika mild | Herkunft: Ungarn | Capsicum annuum L. | | Herzförmiger, roter, milder Gemüsepaprika. |
| C-09-01-051 | Paprika mild | Herkunft: Ungarn | Capsicum annuum L. | | Roter, spitzer, milder Gemüsepaprika. |
| C-09-01-052 | Paprika mild | 'Volcano' | Capsicum annuum L. | | Mild, Leisten können etwas scharf sein. Rote, spitze, mittelgroße Frucht, süß und mild. Feste Haut. |
| C-09-01-055 | Paprika mild | 'Yolo Wonder ' | Capsicum annuum L. | | Niedrig wachsende milde Blockpaprika mit sehr großen, roten Früchten. Anbau besser im Gewächshaus. |
| C-09-01-063 | Paprika mild | Herkunft: Bosnien | Capsicum annuum L. | | Spitzpaprika mit langen leicht gebuchteten Früchten. |
| C-09-01-067 | Paprika mild | 'King of the North' | Capsicum annuum L. | | Süße, ertragreiche, dickfleischige Gemüsepaprika, länglich blockförmig. An kühles Klima angepasst. |
| C-09-01-068 | Paprika mild | 'Lipstick' | Capsicum annuum L. | | Süße, dickfleischige kurze Spitzpaprika. Ertragreich, robust und frühreifend. |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|---|
| C-09-01-070 | Paprika mild | ohne Namen | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 0-1. Dünnfleischige, ungleichmäßig geformte, knautschige, hängende Früchte, 9-15 cm lang, ca.3 cm breit. Gut zum Trocknen. |
| C-09-01-074 | Paprika mild | 'Srvena Roga ' | Capsicum annuum L. | | Süße Spitzpaprika, knautschig geformt, rot reifend, sehr aromatisch. |
| C-09-01-075 | Paprika mild | 'Sweet Banana' | Capsicum annuum L. | | Milde, frühreife, ertragreiche, schmale, längliche Spitzpaprika, von hellgrün über gelb auf rot reifend, dünne Außenhaut. Gut zum roh essen. |
| C-09-01-078 | Paprika mild | 'Hörner' | Capsicum annuum L. | | Ziegenhornpaprika. Vesperpaprika mit länglichen Früchten, ca. 12cm lang, die grün gegessen werden und rot abreifen. Auch zum Frittieren und Anbraten. |
| C-09-01-080 | Paprika mild | Corno di bue giallo | Capsicum annuum L. | | Gelber Spitzpaprika, mild. Reife von grün nach gelb. Große, lange, spitze Früchte. Pflanze sehr hoch wachsend |
| C-09-01-083 | Paprika mild | 'Plovdiver Paprika' | Capsicum annuum L. | | Handelssorte aus Bulgarien. Roter ertragreicher breiter Spitzpaprika, relativ dickfleischig. |
| C-09-01-084 | Paprika mild | 'Iwailowska (Kapia)' | Capsicum annuum L. | | Länglich, spitz zulaufend und rot. Relativ dünnfleischig, Schale eher fest. In Ungarn als Zutat in Paprika-Würzpasten verwendet. |
| C-09-01-086 | Paprika mild | 'Resi' | Capsicum annuum L. | | Über 45 Jahre im Reinthal (Nähe Bruchsaal) kultivierte rote Spitzpaprikasorte, Ursprung Jugoslawien, robuste, gesunde, wüchsige, sehr schmackhafte Freilandpaprika mit hohem Ertrag |
| C-09-01-092 | Paprika mild | 'Frührot' | Capsicum annuum L. | | Gemüsepaprika, flachrund, leicht gerippt, von grün über gelblich nach rot abreifend. Sehr ertragreiche, frühe Sorte. |
| M-99-09-003 | Paprika MIX | | Capsicum sp. | | Bunte Mischung scharf und mild |
| PAPRIKA scharf | | | | | |
| C-09-00-001 | Paprika scharf | 'Aji Cristal' | Capsicum baccatum L. | ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh | Schärfe: 4. Reich tragende, robuste Pflanzen mit 8-12 cm länglichen Früchten, leicht zitroniger, fruchtiger Geschmack, gelb-orange-rot abreifend. |
| C-09-00-003 | Paprika scharf | 'Maule's Red Hot' | Capsicum cf. annuum L. | | Schärfe: 3-5. Längliche gebogene, zarte, rote Früchte, ca. 12-18cm lang. |
| C-09-00-009 | Paprika scharf | Herkunft: Türkei | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 2-3. Frühreife rote Gewürzpaprika, längliche knautschige Blockform, dünnwandig, zarte Haut, gut zum Trocknen und Mahlen. |
| C-09-00-010 | Paprika scharf | Herkunft: Türkei | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 3-4. Die kleineren hängende Früchte sind rot, kegelig, leicht gebogen mit glatter, dicker Haut. Frühreife Sorte, gut geeignet zum Trocknen. |
| C-09-00-012 | Paprika scharf | 'Turuncu spiral rot' | Capsicum cf. annuum L. | | Schärfe: 2-4. Schlanke, spiralig gewundene rot reifende Früchte. |

| | | | | | |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|
| C-09-00-013 | Paprika scharf | 'Pasilla Bajo' | Capsicum cf. chinense Jacq. | | Schärfe: 5-6. Längliche flache ca. 10-15cm lange braune Früchte, unten leicht gebogen. Reift sehr spät dunkelbraun ab. Gut geeignet zum Trocknen, entfaltet dann sein typisches Aroma nach Lakritze und dunkler Schokolade. Für traditionelle mexikanische Mole-S |
| C-09-00-020 | Paprika scharf | 'Bolivian Rainbow' | Capsicum sp. | | Schärfe: 8. Die kleinen essbaren Früchte sind nach oben gerichtet und reifen von violett über beige, gelb, orange bis rot. Auch als dekorative Topfpflanze. |
| C-09-01-001 | Paprika scharf | 'Aji ' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 3-4. Variable, kleinere rote, dickfleischige Früchte, rund bis blockig. |
| C-09-01-004 | Paprika scharf | 'Capela' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 4-6. Kleinere, runde bis keilförmige, Früchte, die orange abreifen. Gut zum Trocknen und Mahlen. Lokalsorte aus dem Kosovo. |
| C-09-01-005 | Paprika scharf | 'Chile piquin' | Capsicum frutescens L. | | Schärfe: 7-8. Sehr kleine, länglich ovale, rote Früchte, aufrecht wachsend. |
| C-09-01-006 | Paprika scharf | 'Chile de arbol' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 6-7. Rot, hängend, schmal, leicht gebogen. Baumartiger Wuchs mit kleinen holzigen Stamm. Typisches, rauchiges Aroma nach dem Trocknen. |
| C-09-01-010 | Paprika scharf | Auslese aus 'Ecuador Purple' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 1. Dekorative Sorte mit violetter Laub. Früchte aufrecht, gedrungen kegelig, 3-5cm lang. Rot abreifend. |
| C-09-01-012 | Paprika scharf | 'Etwas Scharfer' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 3-6. Rote, kleine Spitzpaprika mit hängenden Früchten. Gut zum Trocknen. |
| C-09-01-020 | Paprika scharf | 'Kleinfrüchtiger Scharfer' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 3-5. Spitze, dunkelrote, kompakte, kleine, hängende Früchte, harte Haut. Gut zum Trocknen. |
| C-09-01-021 | Paprika scharf | 'Kleinfrüchtiger Scharfer b' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 3. Stumpfe, dunkelrote, kompakte, kleine, hängende Früchte, harte Haut. Gut zum Trocknen. |
| C-09-01-023 | Paprika scharf | 'Langer Gelber Cayenne' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 5-6. Gelb-orange längliche Früchte, halb-gebogen, gebuchtet, stumpfes Ende. |
| C-09-01-024 | Paprika scharf | 'Lila Luzi' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 6-8. Kleine spitzkegelige nach oben gerichtete Früchte, die von violett über beige, gelb, orange bis rot abreifen. Dekorative Pflanze mit violetter Laub. |
| C-09-01-028 | Paprika scharf | Herkunft: Nepal | Capsicum frutescens L. | | Schärfe: 6-7. Große Pflanze mit kleinen, länglichen, schmalen, roten Früchten, aufrecht wachsend. Ertragreich, lockerbuschiger Wuchs. |
| C-09-01-029 | Paprika scharf | ohne Namen | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 8-9. Schlank und bis 1,50m hoch wachsende, stark behaarte Pflanze mit spät reifenden, aufrecht stehenden, 5-6 cm langen, von schwarz-grün nach roten reifenden Früchten. |
| C-09-01-030 | Paprika scharf | Ohne Namen | Capsicum annuum L. | | Wild-Paprika. Schärfe: 7-8. Kleine buschige Pflanze mit kleinen, schlanken, aufrecht stehenden, spitzen roten Früchten. Verwildert auf La Palma gefunden. |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------|--------------------|--|---|
| C-09-01-031 | Paprika scharf | ohne Namen | Capsicum annuum L. | | Wild-Paprika. Schärfe: 8-9. Kleine buschige Pflanze mit winzigen, schlanken, aufrecht stehenden, roten Früchten. |
| C-09-01-038 | Paprika scharf | Herkunft: Malta | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 7-8. Kleine, länglich stumpfe Früchte, gelb-gelborange abreifend, aufrecht wachsend. |
| C-09-01-044 | Paprika scharf | Herkunft: Türkei | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 1-3. Rote, herzförmige, dickfleischige kleine Paprika aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. Geeignet zu Füllen. |
| C-09-01-045 | Paprika scharf | Herkunft: Türkei | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 2-3. Rote, dickfleischige kleine Paprika, rund mit Spitze. Aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. Geeignet zum füllen. Frühreif. |
| C-09-01-046 | Paprika scharf | Herkunft: Türkei | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 2-3. Dünnfleischige, kleine Spitzpaprika, frühreifend. Aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. Gut geeignet zum Trocknen. |
| C-09-01-047 | Paprika scharf | Herkunft: Türkei | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 4-5. Dünner, langer, spiralig gewundener roter Spitzpaprika mit fruchtigem Aroma; aus einer von türkischen Migranten angebauten Mischung. |
| C-09-01-060 | Paprika scharf | Variegatum | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 6-7. Variegatum. Sorte mit weiß panaschiertem grünen Laub und violetten Blüten. Kleine länglich spitze, hängende Früchte, die von dunkelviolett nach rot abreifen. |
| C-09-01-061 | Paprika scharf | 'Anaheim' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 1-3. Hängende, länglich schmale, glatte, spitz zulaufende, etwas abgeflachte Früchte, 15-20cm lang. Von grün nach dunkelrot reifend. Alte bewährte Sorte, benannt nach der südkalifornischen Stadt Anaheim. |
| C-09-01-062 | Paprika scharf | 'Black Namaqualant' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 6-7. Violette Blüten, stumpf kegelige Früchte, leicht längs gerieft, aufrecht stehend, von schwarz nach schwarzrot bis dunkelrot abreifend. |
| C-09-01-064 | Paprika scharf | Chinesische Chili | Capsicum annuum L. | | Chinesische Mischung. Schärfe: 4-9. Rot abreifende Chilis mit unterschiedlicher Form und Schärfe. |
| C-09-01-069 | Paprika scharf | ohne Namen | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 5-6. Schmale längliche hängende Früchte, unten leicht gebogen, süß im Geschmack. |
| C-09-01-071 | Paprika scharf | 'Padron' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 0-3. Paprika mit ungleich geformten, knautschigen, hängenden Früchten. Bratpaprika, die im grünen Zustand verwendet werden. |
| C-09-01-072 | Paprika scharf | ohne Namen | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 2-3. Dickfleischige, runde, etwas kantige, dunkelrote Früchte, süß und ohne Samen leicht scharf. Kleine Füllpaprika. |
| C-09-01-073 | Paprika scharf | Herkunft: Spanien | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 4-5. Früchte 10-20 cm lang, schlank, glatt und süß. Sehr ertragreich. |
| C-09-01-079 | Paprika scharf | 'Jalapeño Ruben' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 3. Ertragreiche Chili, ca. 7cm lange dickfleischige Früchte mit abgerundeter Spitze und sortentypischen Verkorkungen, rot abreifend. Sie werden häufig grün geerntet, in Essig eingelegt und in Salsa verwendet. |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| C-09-01-082 | Paprika scharf | Auslese aus Auslese ,Peruvian Purple' | Capsicum annuum L. | | Sehr dekorative Pflanzen mit weiß-lila gemusterten Früchten im unreifen Zustand, welche rot abreifen. |
| C-09-01-085 | Paprika scharf | 'Oro picante' | Capsicum annuum L. | | Auslese aus 'Oro'. Mild, aber Leisten und Samen scharf, reift von grün über gelb nach orangerot. Länglich blockig, etwas dickfleischiger als Oro. |
| C-09-01-087 | Paprika scharf | 'Herzpeperoni' | Capsicum annuum L. | | Kleine, runde, rote Kirschaprika mit mittlerer Schärfe (4-6). Pflanzen bleiben klein und buschig |
| C-09-01-088 | Paprika scharf | 'Auslese aus Kleinfr. Scharfer' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 3. Pflanzen mit sehr dekorativen herzförmigen Früchten, die von weiß über orange nach rot abreifen. |
| C-09-01-089 | Paprika scharf | 'Chile de arbol' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 5. braune, leicht blockige hängende Früchte. Sehr dekorativ |
| C-09-01-090 | Paprika scharf | 'Auslese aus Kleinfr. Scharfer' | Capsicum annuum L. | | Schärfe 5, guter Paprikageschmack, herzförmige Früchte |
| C-09-01-091 | Paprika scharf | 'Trottolino Amoroso' | Capsicum annuum L. | | Aufrechte, laubreiche 60-65 cm hohe Pflanzen, Frucht scharf, 6-7 cm lange, aufrechte Früchte zum Füllen oder Einkochen |
| C-09-02-002 | Paprika scharf | ohne Namen | Capsicum baccatum L. | ssp. baccatum | Wild-Paprika, Schärfe: 7-8. Sehr kleine längliche leicht spitze rote Früchte. Große buschige Pflanzen. |
| C-09-02-003 | Paprika scharf | 'Bishops Crown' | Capsicum baccatum L. | ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh | Schärfe: 0-3. Meist mild, Rippen und Kerne sind scharf. Später orangerot reifender Glockenpaprika. |
| C-09-02-005 | Paprika scharf | 'Lemon Drop' | Capsicum baccatum L. | ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh | Schärfe: 7-8. Hellgelbe, dünnwandige, länglich-schmale Früchte mit Spitze. Bei Vollreife dunkelgelb. Fruchtiges Aroma. |
| C-09-02-007 | Paprika scharf | 'Kleine Spitze' | Capsicum baccatum L. | ssp. baccatum | Wild-Paprika, Schärfe: 6-7. Kleine, aufrecht stehende, 1-2 cm langovale rote Früchte. |
| C-09-04-002 | Paprika scharf | ohne Namen | Capsicum chacoense Hunziker | | Wildpaprika, Schärfe: 8-9. Sehr kleine länglich spitz-ovale rote Früchte, mittelspät reifend. Buschige Pflanzen. |
| C-09-05-001 | Paprika scharf | 'Chile Negro' | Capsicum chinense Jacq. | | Schärfe: 7. Braune, längliche, kompakte Frucht, mit ledriger Haut, dünnfleischig, 7-15 cm. Reift von grün-braun nach braun ab, gut geeignet zum Trocknen. |
| C-09-05-002 | Paprika scharf | 'De Cayenne' | Capsicum annuum L. | | Schärfe: 5-6. Dünnwandige, dunkelrot abreifende, schlanke, leicht gebogene Früchte, die sich gut zum Trocknen eignen. Bekannt als Cayennepfeffer. |
| C-09-05-006 | Paprika scharf | ohne Namen | Capsicum chinense Jacq. | | Schärfe: 9. Kleine buschige Pflanze mit vielen aufrecht stehenden schmalen spitzen Früchten, rot abreifend. |
| C-09-05-010 | Paprika scharf | 'Thai-Chili' | Capsicum frutescens L. | | Schärfe: 6-8. Rot, länglich spitz, 4-5cm lang, aufrecht bis geneigt wachsend, früh. Kleiner buschiger Wuchs. |

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|
| C-09-05-012 | Paprika scharf | 'Habanero Hot Paper Lantern' | Capsicum chinense Jacq. | | Schärfe: 5. Färbung von der Spitze her von grün nach gelb zu orange und rot, sehr dekorativ. Guter Geschmack |
| C-09-07-005 | Paprika scharf | 'Peruvian purple' | Capsicum frutescens L. | | Schärfe: 6-7. Kleine, spitz-kegelige, aufrecht wachsende Früchte. Reifen von dunkel-violett über beige, gelb, orange nach dunkelrot ab. Hell-lila Blüten, Blätter dunkelgrün-violett. Kompakter Wuchs. |
| C-09-07-007 | Paprika scharf | Auslese aus 'Peruvian purple' | Capsicum frutescens L. | | Schärfe: 4. Grüne, große Pflanze mit schwarzen großen aufrechten kegelförmigen Früchten. Rot reifend. |

RARITÄTEN

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------|---|---|---|
| P-13-01-001 | Andenbeere, Kapstachelbeere | 'Schönbrunner Gold' | Physalis peruviana L. | | Selektion der HBLVA Wien-Schönbrunn. Früchte groß, süß. |
| P-13-01-002 | Andenbeere, Kapstachelbeere | ohne Namen | Physalis peruviana L. | | Höher wachsende Art mit süßen, aromatischen Früchten. |
| P-13-02-001 | Tomatillo | | Physalis philadelphica Lam. | (= Physalis ixocarpa auct., non Brot. ex Hornem.) | Höher wachsende Art mit großen Früchten. Für Salsa, Suppen und Saucen. |
| L-15-03-001 | Melonenbirne, Pepino | | Solanum muricatum | | auberginenähnliche Pflanze mit eiförmigen, gelblichgrünen Früchten mit lila Streifen. In reifem Zustand Geschmack nach Melonen und Birnen |
| S-14-01-001 | Kleine Baumtomate | | Solanum abutiloides (Griseb.) Bitter et Lillo | | Ausdauernde, nicht winterharte Art mit kirschgroßen, gelben, aromatischen Früchten. |
| S-14-09-001 | Litchi-Tomate | | Solanum sisymbriifolium Lam. | | Einjähriger "Stacheldrahtverhau" mit leuchtend roten, eßbaren Früchten. Die Pflanzen locken Kartoffelkäfer an. |

TOMATEN

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|
| L 15-01-274 | Tomate | große türkische Fleischtomate | Solanum lycopersicum L. | | Große türkische Fleischtomate, sehr guter Geschmack |
| L 15-01-275 | Tomate | Black Trifle | Solanum lycopersicum L. | | Aus Japan, dunkelrot-violett, sehr guter Gschmack und Ertrag |
| L 15-01-276 | Tomate | Albrechts Beste | Solanum lycopersicum L. | | Orangefrüchtige, faustgroße, sehr wohlschmeckende, sehr gesunde und ertragreiche Tomate, aus dem Nachlass von Albrecht G. |
| L-15-00-001 | Wild-Tomate | Herkunft: Peru | Solanum sp. | | Wildtomate mit roten, nur johannisbeergrößen, sehr süßen Früchten. |

| | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|--|--|
| L-15-00-002 | Wild-Tomate | Herkunft: Peru | Solanum sp. | | Rote, johannisbeerförmige Kirschtomate, sehr fest, säuerlich. |
| L-15-01-002 | Tomate | 'A Grappoli da Inverno' | Solanum lycopersicum L. | | Rote mittelgroße Cocktailtomate, sehr robust und ertragreich. Früchte rund mit kleiner Spitze. Schale fest. Die Pflanze wird zum Nachreifen aufgehängt. |
| L-15-01-003 | Tomate | 'Amish Pasta; Amish Paste' | Solanum lycopersicum L. | | Starkwüchsige Fleischtomate mit großen, roten Früchten, von rund-oval bis kugelig. Saucentomate! Von den Amish-People in Wisconsin, Ende 19. Jhd. |
| L-15-01-004 | Tomate | 'Amish Riesentraube' | Solanum lycopersicum L. | | Cocktailtomate, ertragreich, robust, früh reifend, aromatisch. Große Rispen mit vielen kleinen roten, runden Früchten mit Spitze. Begrenzter Wuchs ca. 1,50m. Alte deutsche Sorte, kam vermutlich im 18. Jh. mit Auswanderern nach Amerika. |
| L-15-01-005 | Tomate | 'Ananas-Tomate' | Solanum lycopersicum L. | | Spätreife gelb-orange innen orangerot geflammte Fleischtomate. Aromatische, sehr saftige Früchte mit sehr wenigen Samen, flachrund, leicht gerippt. |
| L-15-01-007 | Tomate | 'Andenhorn' | Solanum lycopersicum L. | | Flaschentomate. Große rote, länglich schmale, spitz zulaufende Früchte. Sehr schmackhaft, mittelspäte Reife, wüchsig und ertragreich. Wenig Samen und Saft, gute Soßentomate. |
| L-15-01-008 | Tomate | 'Ararat Geflammte' | Solanum lycopersicum L. | | Normalfrüchtige, ertragreiche, ungarische Sorte mit kleineren, roten Früchten. Grünkragig, mit nicht ganz platzfester Schale. Intensiver Tomatengeschmack. |
| L-15-01-009 | Tomate | 'Ararat Hellfrucht' | Solanum lycopersicum L. | | Salattomate. Ertragreiche Sorte mit kleineren, rosa bis hellroten Früchten. Schale eher fest. |
| L-15-01-011 | Tomate | 'Aromatomate' | Solanum lycopersicum L. | | Salattomate mit aromatischen mittelgroßen, roten, runden Früchten. Begrenzter Wuchshöhe (ca 1m). |
| L-15-01-013 | Tomate | 'Aunt Rubys German Green' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, grüngelb, Fruchtfleisch bei Vollreife rosafarben, flachrund, teils gerippt, saftig weich, kartoffelblättrig. Geschmackvoll fruchtig-mild. Robuste, mittelfrühe Sorte ursprünglich aus Deutschland, lange in den USA kultiviert. |
| L-15-01-014 | Tomate | 'Bali 2' | Solanum lycopersicum L. | | Salattomate, rot, flachrund, stark gerippt, mit feiner Säure. |
| L-15-01-015 | Tomate | 'Balkonstar' | Solanum lycopersicum L. | | Kleinwüchsige, reichtragende, rote, runde, süße Buschtomate für den Balkonanbau, nicht ausgeizen. Früchte mittelgroß, saftig, intensiver Geschmack. |
| L-15-01-017 | Tomate | 'Banana Legs b' | Solanum lycopersicum L. | | Buschtomate (ca. 1m), gelb, leicht grün geflammt, mittelgroß, länglich spitz zulaufend, feste Schale. Halbreif saftig, vollreif mehlig. Züchtung aus den 80ern von Tom Wagner (USA) |
| L-15-01-018 | Tomate | 'Baselbieter Röteli' | Solanum lycopersicum L. | | Lange Fruchtstände mit roten, ovalen bis birnenförmigen Früchten. Früh reifend, aber nicht ganz platzfest. |
| L-15-01-019 | Tomate | 'Beckers Blaue Dolgener' | Solanum lycopersicum L. | | Relativ platzfeste Fleischtomate, feste Schale, mit violett-braunen, etwas grünkragigen Früchten, flachrund, z T. gefurcht, schwachwüchsig. Gutes Aroma. |

| | | | | |
|-------------|--------|------------------------------|-------------------------|--|
| L-15-01-020 | Tomate | 'Beckers Fleisch' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate mit roten, flachrunden Früchten. Mild, süß-säuerlich-aromatisch, mit fester Schale. Empfindlich gegen längere Nässeperioden. |
| L-15-01-021 | Tomate | 'Bella Donna ' | Solanum lycopersicum L. | Normalfrüchtige spät reifende Rispentomate. Geschmackvolle Stabtomate mit runden bis flachrunden roten Früchten. Hellfruchttyp. |
| L-15-01-023 | Tomate | 'Big Rainbow' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, gelb-orange gestreift. Sehr große, flachrunde, leicht gerippte Früchte, fruchtig süß, leicht säuerlich. Wenig Samen. |
| L-15-01-024 | Tomate | 'Big White Pink Stripes' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, weißgelb, innen rosa gestreift, breitrund, unregelmäßig gekerbt. Saftige, mildsüße, mittelfrühe Stabtomate mit angenehmer Säure. |
| L-15-01-025 | Tomate | 'Big's Red Siberian' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, rot mit gelben Kragen, oval, dünne Schale, spätreifend. |
| L-15-01-026 | Tomate | 'Black Cherry' | Solanum lycopersicum L. | Würzig-süße geschmackvolle, saftige, dabei schnittfeste und platzfeste Cherrytomate mit violetter-braunroter Färbung. Gute Braunfäuletoleranz. |
| L-15-01-027 | Tomate | 'Black Ethiopian Tomato' | Solanum lycopersicum L. | Normalfrüchtig, dunkelrot-braun, etwas grünkragig, oval-rund z.T. mit kleiner Spitze, sehr schmackhaft, wüchsig und relativ robust gegen Braunfäule, mittelfrüh. |
| L-15-01-028 | Tomate | 'Black Plum/Prune Noire' | Solanum lycopersicum L. | Ertragreiche Stabtomate mit dichten Trauben ovaler, braun-roter Früchte mit bräunlich-grünem Ansatz. Platzfest, süß, etwas mehlig. |
| L-15-01-029 | Tomate | 'Blondköpfchen' | Solanum lycopersicum L. | Cocktail-Stabtomate. Gelbe, kleine, angenehm säuerlich schmeckende Früchte in dicht gedrängten, buschigen Trauben. Alte deutsche Sorte. |
| L-15-01-030 | Tomate | 'Blondköpfchen , Debreciner' | Solanum lycopersicum L. | Ungarische Stabtomate mit mittelgroßen, hellgelben, platzfesten Früchten. Fleisch fest und frisch-säuerlich. |
| L-15-01-031 | Tomate | 'Boettner Italian' | Solanum lycopersicum L. | Pastatomate mit viel Fruchtfleisch und wenig Samen. Spitzpaprikaförmige, rote, starkwüchsige Stabtomate mit gutem tomatigem Aroma. |
| L-15-01-032 | Tomate | 'Bonny Best' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, rot, flachrund, weich, spät reifend. |
| L-15-01-034 | Tomate | 'Braune' | Solanum lycopersicum L. | Normalfrüchtige, braunrote, runde Früchte, oft grünkragig. Frühe wohlschmeckende Sorte. |
| L-15-01-036 | Tomate | 'Burbank' | Solanum lycopersicum L. | Freilandsorte des amerik. Pflanzenzüchters Luther Burbank von ca. 1915. Buschtomate mit großen, flachrunden, dunkelroten, festfleischigen Früchten. |
| L-15-01-037 | Tomate | 'Butz German' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate mit großen, rosaroten, flachrunden, leicht gerippten Früchten. Süß, geschmackvoll, fleischig und saftig. |
| L-15-01-038 | Tomate | 'Celsior' | Solanum lycopersicum L. | Rote Cocktailtomate mit süßen, oval-birnenförmigen Früchten. Starkwüchsige robuste Stabtomate. |

| | | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------------------|--|
| L-15-01-039 | Tomate | 'Cerise gelb' | Solanum lycopersicum L. | Wüchsige, robuste Cocktailtomate mit größeren, mild und süßlich schmeckenden gelben Früchten. Nicht ganz platzfest |
| L-15-01-040 | Tomate | 'Cerise rot' | Solanum lycopersicum L. | Stabtomate. Wüchsige, ertragreiche, süße Cocktailtomate. Platzfest, feste Schale. |
| L-15-01-041 | Tomate | 'Chadwicks Cherry' | Solanum lycopersicum L. | Größere Cocktailtomate, rot, plattrund, aromatisch, süß, knackig, saftig, früh, ertragreich, robust, trockenheitstolerant, sehr wüchsig. |
| L-15-01-042 | Tomate | 'Chapmans Beefsteak' | Solanum lycopersicum L. | Busch-Fleischtomate, spät, orangerot bis rot, groß, flachrund mit leichten Einkerbungen, würzig, etwas mehlig, begrenzter Wuchs bis 1,20 m hoch. |
| L-15-01-045 | Tomate | 'Cherry Zebra Stab' | Solanum lycopersicum L. | Robuste Cocktailtomate mit vielen kleinen Trauben. Früchte dunkelrot-grün gestreift mit fester Schale und braunrotem Fruchtfleisch. |
| L-15-01-046 | Tomate | 'Clear Pink Early' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate mit begrenztem Wuchs ca. 80cm. Die kleineren Früchte sind dunkelrosa, saftig, flachrund, fleischig und mit weicher Schale. Sehr aromatisch. |
| L-15-01-048 | Tomate | 'Colorado' | Solanum lycopersicum L. | Busch-Fleischtomate, mittelfrüh, rot, rund-ovalrund, leicht gerippt, süßlich, tomatig, begrenzter Wuchs bis ca. 80cm. Von unten her etwas ausgeizen. |
| L-15-01-049 | Tomate | 'Columbus' | Solanum lycopersicum L. | Wüchsige Salattomate mit rund bis oval-runden, kleineren, roten, festen Früchten. Guter Geschmack mit angenehmer Säure. |
| L-15-01-050 | Tomate | 'Costa Firenze' | Solanum lycopersicum L. | Busch-Fleischtomate, rot, flachrund, am Kragen leicht gerippt, früh, fruchtig süß, wenig Säure, aromatisch, begrenzter Wuchs bis ca. 80cm. Etwas ausgeizen. |
| L-15-01-052 | Tomate | 'Crimea Tomato' | Solanum lycopersicum L. | Salattomate mit rosaroten, beutelförmigen, mittelgroßen, leicht mehligten Früchten. Lang tragend und robust. |
| L-15-01-053 | Tomate | 'Crnkovic Yugoslavian' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, rosa bis hellrot, groß flachrund, gerippt, unregelmäßig geformt, eher feste Schale, spätreif, saftig, süß, guter Geschmack. |
| L-15-01-056 | Tomate | 'Cuor di bue' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate aus Italien mit karmesinroten, großen, ausgezeichnet schmeckenden Früchten mit leicht gerippten Schultern. Wüchsige, mittelspäte Sorte für den geschützten Anbau. |
| L-15-01-057 | Tomate | 'Czech Tomatoe' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate mit dunkel rosaroten, leicht gerippten, flachrunden, fleischig und saftigen Früchten. Milder Geschmack, aromatisch. |
| L-15-01-058 | Tomate | 'Dattelwein' | Solanum lycopersicum L. | Stabtomate. Buschige Trauben mit gelben, birnenförmigen bis ovalen Einzelfrüchten. Massenträger mit süß-säuerlich-aromatischen, wohlschmeckenden Früchten, sehr platzfest. Für Freiland und Gewächshaus. Relativ frühreif. |

| | | | | |
|-------------|--------|-------------------------------|-------------------------|---|
| L-15-01-059 | Tomate | 'De Berao' | Solanum lycopersicum L. | Alte, bis 4 m hohe Sorte, lang-ovale, große, rote, leicht mehlig Fruchten. Sehr hoher, später Ertrag. Relativ krautfäuletolerant. Gut geeignet für Soßen. |
| L-15-01-060 | Tomate | 'De Colgar' | Solanum lycopersicum L. | Rote starkwüchsige Cocktailtomate, rund bis leicht spitzoval, schwach gerippt, mittelfrüh, ertragreich, süß, schmackhaft, dicke Schale, Lagertomate. |
| L-15-01-061 | Tomate | 'Druzba' | Solanum lycopersicum L. | Rote Fleischtomate, rund bis breitrund, am Kragen schwach gerippt, vollfleischig, mittelfrüh, süß, kräftig, alte robuste Sorte aus Bulgarien. |
| L-15-01-063 | Tomate | 'Early Siberian' | Solanum lycopersicum L. | Busch-Salattomate, kartoffelblättrig, feste Schale, rund, sehr früh, säurebetont, begrenzter Wuchs bis ca.80cm, sehr unempfindlich, sehr kältetolerant. |
| L-15-01-064 | Tomate | 'Early Yellow Striped Tomato' | Solanum lycopersicum L. | Salattomate, rund, z.T. etwas abgeflacht, rosarot mit gelber Streifung, saftig weich, süß, aromatisch, früh, ertragreich. Geschützter Anbau wird empfohlen. |
| L-15-01-066 | Tomate | 'Ficarazzi' | Solanum lycopersicum L. | Rote Fleischtomate, plattrund, schwach-stark gerippt, guter Geschmack. Robuste alte deutsche Sorte, 1906 unter 'Geisenheimer' oder 'Johannisfeuer' gehandelt. |
| L-15-01-067 | Tomate | 'Österreicher Ochsenherz' | Solanum lycopersicum L. | Kleinere frühe Ochsenherztomate, meist herzförmig, am Kragen leicht gerippt, fleischig, wenig Samen, aromatisch, dünnchalig, schwachwüchsig. |
| L-15-01-068 | Tomate | 'Fructa' | Solanum lycopersicum L. | Rote, runde Buschtomate. Früchte aromatisch, angenehm sauer, saftig, leider nicht ganz platzfest. |
| L-15-01-069 | Tomate | 'Frühstamm' | Solanum lycopersicum L. | Jahrzehnte alter Klassiker. Massenträger mit roten, saftigen, runden, eher festen Früchten. Widerstandsfähige Sorte. |
| L-15-01-070 | Tomate | 'Frühzauber Dolgener' | Solanum lycopersicum L. | Salattomate, rot, klein, rund, eher feste Schale, mittelfrüh, süß-aromatisch. |
| L-15-01-071 | Tomate | 'Fuzzy Wuzzy' | Solanum lycopersicum L. | Stark behaarte Buschtomate mit kleinen, runden, etwas zugespitzten, erst grün-weiß, dann rot-gelb gestreiften Früchten. Gut für Kübel und Balkon. |
| L-15-01-073 | Tomate | 'Gelbe Fleisch' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate. Ertragreich, gelbe große, runde Früchte, schwach gerippt, mittelspäte Reife. Aromatisch, mild, wenig Säure. |
| L-15-01-074 | Tomate | 'Gelbe Kaki' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate. Mittelgroße, runde Früchte mit intensiv gelb-oranger Farbe. Russische Sorte. |
| L-15-01-075 | Tomate | 'Gelbe Kirschtomate' | Solanum lycopersicum L. | Kirschtomate. Robuste, wüchsige Naschtomate mit kleinen gelben Früchten. Feste Schale, süßsauerlich. Kann mehrtriebzig gezogen werden. |
| L-15-01-076 | Tomate | 'Gelbe Melone' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate. Russische Sorte mit gelb bis gelb-orangen Früchten. Weiche, dünne Schale, groß, flachrund, leicht gefurcht. Aromatisch mit angenehmer Säure. |
| L-15-01-077 | Tomate | 'Gelbe Russische' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate mit gelben, flachrunden, mittelgroßen Früchten. |

| | | | | |
|-------------|--------|--------------------------------|-------------------------|---|
| L-15-01-079 | Tomate | 'German Head' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, rot, leicht gerippt, sehr groß, Risse am Kragen. Fruchtig, aromatisch, leicht säuerlich. |
| L-15-01-080 | Tomate | 'Geschweins Purple Bonny Best' | Solanum lycopersicum L. | Rote Fleischtomate gelbkragig, rund, mittelfeste Schale, leicht säuerlich-aromatisch, spätreifend. |
| L-15-01-081 | Tomate | 'Gezahnte aus Ligurien' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate mit mittelgroßen bis großen, roten Früchte, stark gerippt. |
| L-15-01-082 | Tomate | 'Giant Belgium' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, rosa, gleichmäßig geformt, leicht gerippt, flachrund, festes Fleisch, frühreif, aromatisch, fruchtig-säuerlich. Wüchsige, mittelgroße Sorte aus den USA. |
| L-15-01-083 | Tomate | 'Glory of Moldava' | Solanum lycopersicum L. | Normalfrüchtige Buschtomate mit orangen, rund bis hochrunden, teilweise leicht gefurchten Früchten. Sehr feste Konsistenz auch bei Reife. |
| L-15-01-085 | Tomate | 'Golden Currant' | Solanum lycopersicum L. | Ertragreiche Cocktailtomate, die mehrtriebig gezogen werden kann. Kleine, runde, feste, orange-gelbe Früchte. Saftig, weich, etwas säuerlich. |
| L-15-01-086 | Tomate | 'Goldene Königin' | Solanum lycopersicum L. | Mittelstark wachsende Freilandtomate, mäßig platzfest. Goldgelbe, runde, mittelgroße Früchte mit wenig Säure, mild, aromatisch. Alte deutsche Sorte von 1871. |
| L-15-01-087 | Tomate | 'Gourmet Filler' | Solanum lycopersicum L. | Ertragreiche mittelspäte gelbe Stabtomate, blockpaprikaförmig, dickwandig mit Hohlräumen, gut zum Füllen oder für Soße. |
| L-15-01-090 | Tomate | 'Green Skin Longkeeper' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, grünlich-fahlrosa, blaß, flachrund, 1,20 m hoch. |
| L-15-01-091 | Tomate | 'Green Zebra' | Solanum lycopersicum L. | Grün-gelb gestreifte, grünfleischige, saftige, sehr schmackhafte Stabtomate aus den USA mit runden, leicht gefurchten Früchten. Neuzüchtung von 1985. |
| L-15-01-092 | Tomate | 'Greenwich' | Solanum lycopersicum L. | Schwachwüchsige Fleischtomate mit gutem Ertrag, grün-gelblich, flachrund, unterschiedlich stark gekerbt, vollfleischig, mild. Geschützter Anbau wird empfohlen. |
| L-15-01-094 | Tomate | 'Große Kroatische Paradeiser' | Solanum lycopersicum L. | Rote Fleischtomate, groß, flachrund, eher fest. |
| L-15-01-095 | Tomate | 'Großmutter' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate mit runden, mittelgroßen roten Früchten. Seit 25 Jahren eigene Auslese der Gärtnerei Witt in Emmendingen. |
| L-15-01-098 | Tomate | 'Grushovka' | Solanum lycopersicum L. | Busch-Fleischtomate, mittelfrüh, rosa-hellrot, langoval mit stumpfer Spitze, saftig weich, süß, aromatisch, begrenzter Wuchs bis ca. 80cm. |
| L-15-01-099 | Tomate | 'Harzfeuer' | Solanum lycopersicum L. | Alte Sorte mit mittelgroße roten, runden Früchte, Laub kartoffelblättrig. |
| L-15-01-100 | Tomate | 'Harzfeuer Hellfrucht' | Solanum lycopersicum L. | Salattomate. Widerstandsfähige Handelssorte mit hellroten, saftigen Früchten, die bei viel Regen aufplatzen. Kartoffelblättrig. |

| | | | | |
|-------------|--------|--------------------------------|-------------------------|--|
| L-15-01-101 | Tomate | 'Hawaiian' | Solanum lycopersicum L. | Starkwüchsige Kirschtomate aus den USA, rot, süß, feste Schale, kälte- und braunfäuletolerant. |
| L-15-01-102 | Tomate | 'Hellfrucht' | Solanum lycopersicum L. | Salattomate. Ertragreiche, widerstandsfähige Handelssorte mit runden, mittelgroßen, festen, hellroten, saftigen, sehr schmackhaften Früchten. |
| L-15-01-103 | Tomate | 'Herzförmige aus Zagreb' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, rot, herzförmig bis länglich-oval mit Spitze, fleischig, z.T. hohl, am Kragen leicht gerippt, feste dünne Schale, fruchtig, wenig Samen, z.T. mehlig, gute Soßentomate. |
| L-15-01-104 | Tomate | 'High Country' | Solanum lycopersicum L. | Busch-Salattomate, rot, rund, feste Schale, säurebetont, früh, begrenzter Wuchs bis ca. 1m. Herkunft USA. |
| L-15-01-105 | Tomate | 'Hillibilly' | Solanum lycopersicum L. | Orange Fleischtomate, innen rot. |
| L-15-01-106 | Tomate | 'Holländische Pflaumentomate' | Solanum lycopersicum L. | Cocktailtomate. Früchte klein, rot, oval-eiförmig. Sehr wüchsige Sorte mit gutem Geschmack. |
| L-15-01-107 | Tomate | 'Hopi-Tomate' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate mit leuchtend roten, flachrunden, stark gerippten Früchten. Solche wurden schon von den Indianerkulturen New Mexicos angebaut. Aromatisch. |
| L-15-01-110 | Tomate | 'Hungarian Heirloom Tomato' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, rosa-rot, sehr große, flachrunde, süße, saftige Früchte mit weicher Schale. Späte, alte Sorte aus Ungarn. |
| L-15-01-112 | Tomate | 'Hybrid-2 Tarasenko' | Solanum lycopersicum L. | Salattomate, rot, rundoval mit Spitze, mild, spätreifend, samenfest trotz des Namens |
| L-15-01-113 | Tomate | 'Immun Prior' | Solanum lycopersicum L. | Ertragreiche rote Buschtomate, mittelspät, leicht oval, zarte Spitzung, fleischig, dickwandig, leicht mehlig, aromatisch. Soßentomate. Begrenzter Wuchs bis 1m. |
| L-15-01-114 | Tomate | 'Indische' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate mit dunkelroten bis oliv-braunen, etwas grünkragigen, abgeflachten, aromatischen Früchten mit saftigem Fleisch. |
| L-15-01-115 | Tomate | 'Isis Cherry' | Solanum lycopersicum L. | Frühe Cocktailtomate, orange, z.T. plattrund, leicht gekerbt, guter Geschmack. Nicht ganz platzfest. |
| L-15-01-116 | Tomate | 'Italienische Cocktail-Tomate' | Solanum lycopersicum L. | Ovale bis eiförmige rote knackige Früchte, sehr guter Geschmack, frühreif und reich im Ertrag. |
| L-15-01-117 | Tomate | 'Japanische Trüffel' | Solanum lycopersicum L. | Stabtomate mit beutelförmigen, kleineren, rotbraunen, grünkragigen Früchten. Guter Geschmack. |
| L-15-01-118 | Tomate | 'Kecskemeti 7' | Solanum lycopersicum L. | Frühreife Busch- Fleischtomate. Früchte rot, flachrund, etwas gefurcht und grünkragig. Geschmack süß-säuerlich und mild-aromatisch, Schale mittelfest. |
| L-15-01-119 | Tomate | 'Kecskemeti Karoi Bibar' | Solanum lycopersicum L. | Salattomate Ca. 1m hohe rote Salattomate. Früchte rund, oben leicht abgeflacht. Glatte, eher weiche Schale. Früh, saftig und gut im Geschmack. Robust, ertragreich. |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| L-15-01-120 | Tomate | 'Kirgisische' | Solanum lycopersicum L. | | Busch-Fleischtomate, rot, rund mit stumpfer Spitze, mittelspät, begrenzter Wuchs 60 bis 80cm. Von Migranten am Kaiserstuhl seit Jahrzehnten kultiviert. |
| L-15-01-121 | Tomate | 'Kirschtomate' | Solanum lycopersicum L. | | Mittelfrühe, rote und runde Cocktailtomate mit sehr langen, dekorativen Fruchtständen. Wenig Säure. Nicht platzfest. |
| L-15-01-122 | Tomate | 'Large Pink Bulgarian' | Solanum lycopersicum L. | | Rosarote Fleischtomate, flachrund, leicht gerippt. |
| L-15-01-123 | Tomate | 'Liguria' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, hellrot, ertragreich. Gerippte, feste, beutelförmige-breitrunde Früchte, z.T. innen etwas hohl. Aromatisch mild, wenig Samen. |
| L-15-01-124 | Tomate | 'Lila Sari' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate mit dunkelrosa bis bräunlich-violettenrunden, etwas abgeflachten Früchten, etwas grünkräbig. Im Freiland etwas empfindliche Sorte. |
| L-15-01-125 | Tomate | 'Lime Green Salad' | Solanum lycopersicum L. | | Normalfrüchtige Buschtomate bis ca. 50cm hoch, mit goldgelben bis ockergrünen, süßen Früchten. |
| L-15-01-126 | Tomate | 'Linharts Riese' | Solanum lycopersicum L. | | Hellrote Fleischtomate, sehr groß, saftig, fleischig, z.T. hohl, flachrund, oben eingekerbt, dünnchalig, aromatisch, angenehme Säure, Herkunft Russland. |
| L-15-01-129 | Tomate | 'Maritza Rose' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, rosa-rosarot, rund, am Kragen leichte Einkerbungen, saftig, fleischig, weichschalig, leichte Säure, intensiver Geschmack. Herkunft Bulgarien. |
| L-15-01-130 | Tomate | 'Marktwunder' | Solanum lycopersicum L. | | Rote runde Salattomate mit begrenztem Wuchs bis ca. 1,20m. Milder Geschmack, eher weiche Schale. |
| L-15-01-131 | Tomate | 'Marmande de Pays' | Solanum lycopersicum L. | | Stabtomate. Rote Fleischtomate mit mittelgroßen, plattrunden, leicht gerippten, Früchten mit intensivem Geschmack, festem Fleisch und fester Schale. |
| L-15-01-132 | Tomate | 'Marvel Striped' | Solanum lycopersicum L. | | Sehr alte Sorte der Zapotec. Früchte sind rund, sehr schön und guter Geschmack. Fleischtomate mit sehr großen, gelb-rot gestreiften Früchten |
| L-15-01-133 | Tomate | 'Matina' | Solanum lycopersicum L. | | Salattomate mit roten, weichfleischigen, aromatischen Früchten. Altbewährte robuste, frühe Freilansorte, Klassiker im Bio-Anbau. Kartoffelblättrig. |
| L-15-01-134 | Tomate | 'Merveille des Marches' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate mit roten, runden, festen, bei Überreife leicht mehligem Früchten mit weicher Schale. Aromatisch, fruchtig säuerlich. Robuste kompakt wachsende alte französische Landsorte Ende 18. Jahrhundert. |
| L-15-01-135 | Wild-Tomate | Herkunft: Mexiko | Solanum lycopersicum L. | | Robuste Wildtomate mit sehr kleinen, roten, runden, aromatisch süßen Früchten. |
| L-15-01-136 | Tomate | 'Miel de Mexico' | Solanum lycopersicum L. | | Robuste Cocktailtomate mit roten, saftigen, süßen Früchten an langen Rispen. Schale dünn und platzfest. Ähneln 'Zuckertraube'. |

| | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------|-------------------------|------|---|
| L-15-01-137 | Tomate | 'Moneymaker' | Solanum lycopersicum L. | | Bewährte Hellfrucht. Robuste, normalfrüchtige, ertragreiche, wohlschmeckende Stabtomate. Glatte, mittelgroße, saftige, hellrote, platzfeste Früchte. |
| L-15-01-138 | Tomate | 'Nectar Rose' | Solanum lycopersicum L. | | Robuste starkwüchsige Salattomate, rosarot-rot, leicht ovalrund mit leichter Spitze, süß, aromatisch, mittelfrüh, kartoffelblättrig. |
| L-15-01-139 | Tomate | 'Noire de Crimée' | Solanum lycopersicum L. | | Niedrig wachsende kräftige Stabtomate. Früchte braun-rot, grünkragig, flachrund, saftig, mit mildem Geschmack. Braunfäule-anfällig. Geschützter Anbau. |
| L-15-01-140 | Tomate | 'Northern Delight' | Solanum lycopersicum L. | | Rote Cocktailltomate. Buschtomate mit aromatischen, leicht ovalen Früchten. Guter und früher Ertrag. |
| L-15-01-141 | Tomate | 'Ochsenherz gelb' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate mit herzförmigen, sehr schweren, saftigen Früchten. Weiche Schale, aromatisch-würziger Geschmack. Geschützter Anbau. |
| L-15-01-142 | Tomate | 'Ochsenherz orange' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate. Dünnschalige, fleischige, saftige Früchte mit feinem Aroma, die jedoch nur wenige Samen enthalten. |
| L-15-01-143 | Tomate | 'Ochsenherz rosarot' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate. Dünnschalige, fleischige, saftige, schmackhafte Früchte, die nur wenige Samen enthalten. |
| L-15-01-144 | Tomate | 'Russisches Ochsenherz' | Solanum lycopersicum L. | | Schwachwüchsige, ertragreiche Fleischtomate mit herzförmigen, oben etwas gerippten, großen, roten, fleischigen Früchten, aromatisch, sehr früh. |
| L-15-01-146 | Tomate | 'Olirose de St. Domingue' | Solanum lycopersicum L. | | Salattomate, rosarot-hellrot. Rundovale Früchte mit leichter Spitze, saftig weich, süß, mild, fruchtig. Weiche, nicht ganz platzfeste Schale. Ertragreiche mittelfrühe Sorte aus Haiti. |
| L-15-01-147 | Tomate | 'Opal Essence' | Solanum lycopersicum L. | | Salattomate mit runden bis leicht herzförmigen rosaroten, saftigen Früchten mit angenehmer Säure. Die Schale ist eher dick und fest. |
| L-15-01-149 | Tomate | 'Orange Favourite' | Solanum lycopersicum L. | Ozar | Salattomate, leuchtend orange. Saftige, runde mittelgroßen Früchte mit fester Schale. Süß-sauer fruchtig, bei Vollreife eher wässrig, mittelfrüh. |
| L-15-01-150 | Tomate | 'Orange Fleischtomate' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate. Kaum krankheitsanfällig, spät reifend, wenig Säure, große feste, orange Früchte, bei Vollreife leicht mehlig. |
| L-15-01-151 | Tomate | 'Orange Russische' | Solanum lycopersicum L. | | Russische Buschtomate mit großen runden leuchtend orangen Früchten. |
| L-15-01-152 | Tomate | 'Ovo Brasileiro' | Solanum lycopersicum L. | | Normalfrüchtige Buschtomate, oval, festfleischig, saftig, aromatisch, leichte Säure, feste Schale, begrenzter Wuchs ca. 80cm. |
| L-15-01-153 | Tomate | 'Malinowy Ozarowski' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, hellrot. Kleinere runde, leicht abgeflachte, weiche Früchte mit eher fester Schale, süß, aromatisch. Mittelfrühe kartoffelblättrige Sorte aus Polen. |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------------------|-------------------------|--|---|
| L-15-01-154 | Tomate | 'Paprika Italia' | Solanum lycopersicum L. | | Stuffer, ideal zum Füllen geeignet. Gerippte, rote, hohle, dickwandige Früchte mit wenig Saft und Samen. Auch als Soßentomate gut geeignet. |
| L-15-01-155 | Tomate | 'Paprikaförmige' | Solanum lycopersicum L. | | Mäßig stark wachsende Fleischtomate mit mattroten, aromatischen und saftigen Früchten. |
| L-15-01-156 | Tomate | 'Paradeiser aus Zagreb' | Solanum lycopersicum L. | | Flaschentomate, hellrot. Längliche, walzenförmige Früchte mit Spitze, schnittfeste Schale, spät. Fruchtiger Geschmack. |
| L-15-01-157 | Tomate | 'Paul Robeson' | Solanum lycopersicum L. | | Wüchsige Stabtomate mit oval-runden, dickfleischigen, braun-roten und grünkragigen Früchten, wohlschmeckend. Benannt nach dem Opernsänger Paul Robeson. |
| L-15-01-158 | Tomate | 'Pepper-Shaped Tomato' | Solanum lycopersicum L. | | Flaschentomate, rot. Größere, spitzpaprikaförmige, leicht hohle Früchte mit z.T. abgesetzter Spitze. Feste Schale, vollreif eher mehlig. Sehr wüchsige mittelspäte Soßentomate mit wenig Samen. |
| L-15-01-159 | Tomate | 'Phyra Pötschke' | Solanum lycopersicum L. | | Kirschtomate, rot, klein, oval, feste Schale, milder Geschmack. |
| L-15-01-161 | Tomate | 'Pink-White' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, rot. Runde, große, leicht gerippte, saftige und fleischige Früchte mit fester dünner Schale. Aromatisch mit angenehmer Säure. Eher spät reifend. |
| L-15-01-162 | Tomate | 'Piroka' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate mit großen, süßen, roten Früchten und gutem Ertrag. Geeignet als Salattomate. Anbau im Freiland mit Regenschutz. |
| L-15-01-163 | Tomate | 'Polnisches Ochsenherz' | Solanum lycopersicum L. | | Große Fleischtomate, rosarot, herzförmig, saftig, vollfleischig, dünne weiche Schale, aromatisch, schwachwüchsig. |
| L-15-01-164 | Tomate | 'Pomodore Canestrino' | Solanum lycopersicum L. | | Ertragreiche, mittelgroße, saftige Fleischtomate mit mildem Aroma, mit wenig Flüssigkeit in den Kammern. |
| L-15-01-165 | Tomate | 'Ponderosa Pink' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate mit rosa mittelgroßen, flachrunden, teilweise gerippten, aromatischen Früchten mit wenigen Samen. Robuste Sorte, seit 1891 in den USA. |
| L-15-01-166 | Tomate | 'Powers Heirloom' | Solanum lycopersicum L. | | Gelbe Fleischtomate, oval, ausgeprägte Spitze, mild, süß, fruchtig. |
| L-15-01-167 | Tomate | 'Prince Borghese' | Solanum lycopersicum L. | | Robuste rote Cocktailtomate. Früchte in großen Büscheln wachsend, ertragreich, rund mit kleiner Spitze, platzfest, süß. |
| L-15-01-168 | Tomate | 'Prudence Purple' | Solanum lycopersicum L. | | Rote, flachrunde Fleischtomate mit dünner Schale und würzigem, süßsaurem Geschmack. Hervorragende Soßentomate. |
| L-15-01-169 | Tomate | 'Pulpy Pink' | Solanum lycopersicum L. | | Mittelgroße, mild-aromatische Fleischtomaten mit intensiv-roter Farbe. Im Freiland sehr anfällig gegenüber Braunfäule. |
| L-15-01-170 | Tomate | 'Puszt Kolosz' | Solanum lycopersicum L. | | Rote Fleischtomate, riesige flachrunde Früchte, am Kragen gefurcht, saftig, dünnschalig, spät, guter Geschmack, wüchsig. Herkunft Ungarn. |
| L-15-01-171 | Tomate | 'Quadro' | Solanum lycopersicum L. | | Braunfäuletolerante, rote Eiertomate, ertragreich. Mehliges Kochtomate, bewährte Hobbygärtnersorte. |

| | | | | | |
|-------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|--|
| L-15-01-172 | Tomate | 'Quedlinburger Frühe Liebe' | Solanum lycopersicum L. | | Stabtomate mit gelbkragigen roten, runden, manchmal leicht konischen, saftigen, festen Früchten. Altbewährte robuste kartoffelblättrige Sorte. |
| L-15-01-173 | Tomate | 'Racje Sklenikové' | Solanum lycopersicum L. | | Rote, runde Früchte, grünkragig, feste Schale, säuerlicher Geschmack, mittelfrüh, Pflanze kartoffelblättrig. |
| L-15-01-174 | Tomate | 'Red Cavern' | Solanum lycopersicum L. | | Stuffertomate, innen hohl, daher zum Füllen geeignet, paprikaförmig. Unreif orange-rot gestreift, wird bei Reife rot. Ertragreich, relativ gut lagerfähig. Auch gut als Soßentomate. |
| L-15-01-175 | Tomate | 'Red Peach' | Solanum lycopersicum L. | | Normalfrüchtige, hellrote Salattomate mit weicher, leicht pelziger Schale, saftig, reift eher spät. |
| L-15-01-176 | Tomate | 'Red Sibirian' | Solanum lycopersicum L. | | Rote, plattrunde, große Fleischtomate, rissiger Grünkragen, saftig, süß. |
| L-15-01-178 | Tomate | 'Reisetomate' | Solanum lycopersicum L. | | Kuriose Stabtomate. Rote säuerliche Frucht teilbar, ohne daß der Saft austritt, da die Fruchtkammern voneinander getrennt sind. Ursprünglich von Indios aus Guatemala. |
| L-15-01-179 | Tomate | 'Rio Grande' | Solanum lycopersicum L. | | Rote Buschtomate mit kräftigem Wuchs, leichtes Ausgeizen erforderlich. Früchte eiförmig mit leichter Spitze, sehr feste Schale, lagerfähig. |
| L-15-01-180 | Tomate | 'Roma' | Solanum lycopersicum L. | | Eiertomate mit roten, länglich ovalen platzfesten Früchten. Schnell mehlig, gute Soßentomate. |
| L-15-01-181 | Tomate | 'Rosa Gigant' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate aus Russland mit rosafarbenen sehr aromatischen, großen, flachrunden, gerippten Früchten, die relativ spät reifen. |
| L-15-01-182 | Tomate | 'Rosii Marunte' | Solanum lycopersicum L. | | Cocktailtomate aus Rumänien, sehr wüchsig, gesund und frühreif. Früchte kirschgroß, rot, rund, knackig, platzfest. Kann mehrtriebiger gezogen werden. |
| L-15-01-183 | Tomate | 'Rote Birne Österreicher' | Solanum lycopersicum L. | | Birnenförmige, größere Cocktailtomate, nicht platzfest. Rote Früchte leicht säuerlich, mittelfrüh. |
| L-15-01-185 | Tomate | 'Rote Russische Eiertomate' | Solanum lycopersicum L. | | Stabtomate mit roten, ovalen bis eiförmigen Früchten, festfleischig und dickwandig. Soßen- und Salattomate. |
| L-15-01-187 | Tomate | 'Roter Nil' | Solanum lycopersicum L. | | Ertragreiche rote Fleisch-Buschtomate, festfleischig, variable Fruchtform rund bis oval, aromatisch, alter Hellfrucht-Typ aus Ägypten. Begrenzter Wuchs 1m. |
| L-15-01-188 | Tomate | 'Roter Pfirsich' | Solanum lycopersicum L. | | Stabtomate mit blassroten, runden, fein beflaumten Früchten, Kuschele.tomate. |
| L-15-01-190 | Tomate | Herkunft: Rumänien | Solanum lycopersicum L. | | Rote Fleischtomate aus dem Dorf Giarmata. Süß-säuerlich und wohlschmeckend, aromatisch, resistent gegen Braunfäule. |
| L-15-01-191 | Tomate | 'Russian Lime' | Solanum lycopersicum L. | | Salattomate mit hellgelben, zitronenförmigen, festen Früchten. Hängen in großen Büscheln, sehr ertragreich. Sorte aus Russland. |

| | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------|-------------------------|--|--|
| L-15-01-192 | Tomate | 'Russische Große Gelbe' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate mit großen gelben, flachrunden, dünnschaligen leicht säuerlichen Früchten. Kartoffelblättrig. |
| L-15-01-193 | Tomate | 'Russische Fleischtomate' | Solanum lycopersicum L. | | Starkwüchsig, mittelspät. Orangerote Früchte riesig, oval-breitrund bis beutelförmig, gerippt, fleischig, weichschalig, süß-würzig. Pflanze gut stützen! |
| L-15-01-194 | Tomate | 'Russische Wintertomate' | Solanum lycopersicum L. | | Wüchsige Stabtomate. Cocktailtomate mit länglichen oval-birnenförmigen roten, süßen, Früchten. Die Pflanze wird zum Nachreifen aufgehängt. |
| L-15-01-195 | Tomate | 'Ruth' | Solanum lycopersicum L. | | Leuchtend rote, feste, runde- leicht herzförmige, aromatische, größere Cocktailtomate, wenig Säure, mild-süßer Geschmack. Können lange an der Pflanze ausreifen. |
| L-15-01-196 | Tomate | 'Ruthje' | Solanum lycopersicum L. | | Selektion aus 'Ruth', Früchte 3-5 cm groß, knackig, tomatig, fruchtig-süß, leichte Säure. |
| L-15-01-197 | Tomate | 'San Marzano' | Solanum lycopersicum L. | | Längliche, rote, mittelgroße bis große Flaschentomate mit wenigen Kernen. Die klassische italienische Pizza-Tomate, auch zum Trocknen geeignet. |
| L-15-01-199 | Tomate | 'San Marzano Freiburger' | Solanum lycopersicum L. | | Flaschentomate. Kleinfrüchtiger und ertragreicher als die klassische San Marzano, nicht ganz platzfest. Auslese von Herrn Freiburger. |
| L-15-01-200 | Tomate | 'Sandpoint' | Solanum lycopersicum L. | | Busch-Salattomate, niedrig wachsend bis 60cm, nicht ausgeizen, rot, rund, mittelgroß, süßlich, aromatisch. |
| L-15-01-201 | Tomate | 'Sawan Bali 1' | Solanum lycopersicum L. | | Salattomate, rot, flachrund, stark gerippt. Sehr wüchsige und robuste Sorte. |
| L-15-01-203 | Tomate | 'Schurr-Wolffs Beste' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, rot. Runde, saftige, aromatische Früchte mit fester Schale. |
| L-15-01-204 | Tomate | 'Schwarze' | Solanum lycopersicum L. | | Mittelgroße, runde, braun-rote, etwas grünkragige, süße Früchte mit fester Schale. |
| L-15-01-206 | Tomate | 'Schwarze Russische' | Solanum lycopersicum L. | | Sorte mit mittelgroßen, außen und innen braun-roten, in der Form variablen, manchmal grünkragigen Früchten. Süß, mit gutem Geschmack. |
| L-15-01-208 | Tomate | 'Shimmeig Creg' | Solanum lycopersicum L. | | Geschmackvolle Fleischtomate, orange rot gestreift, rundoval bis herzförmig, festfleischig, saftig, süß-säuerlich, begrenzter Wuchs, ca. 1,20 m, nur leicht ausgeizen. |
| L-15-01-209 | Tomate | 'Siberian' | Solanum lycopersicum L. | | begrenzter Wuchs, reich tragend, rote, mehlig aromatische, fruchtige Früchte, leicht gekerbt |
| L-15-01-211 | Tomate | 'Snow White Cherry' | Solanum lycopersicum L. | | Stabtomate mit vielen cremefarbenen, fruchtig milden Früchten, plattrund mit leichter Furchung. Nicht sehr platzfeste, dünnhäutige Cocktailtomate. |
| L-15-01-212 | Tomate | 'Sochulak Tomato' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, hellrot, oval, länglich, eher weiche Schale. |
| L-15-01-213 | Tomate | 'Spitze Österreicher' | Solanum lycopersicum L. | | Rote wüchsige Pastatomate, spitzpaprikaförmig, z.T. abgesetzte Spitze, fleischig, wenig Samen, süß-säuerlich, feste Schale. |

| | | | | |
|-------------|--------|-----------------------------|-------------------------|---|
| L-15-01-214 | Tomate | 'Spitzige Paradeiser' | Solanum lycopersicum L. | Buschtomate, rot. Größere ovale Früchte mit Spitze. Milder Geschmack, mittelspät. Begrenzter Wuchs bis ca. 1 m. |
| L-15-01-216 | Tomate | 'Mirabelle' | Solanum lycopersicum L. | Robuste ertragreiche, stachelbeerförmige Cocktailtomate mit leuchtend gelben Früchten mit durchscheinenden Adern, in Büscheln wachsend. Früchte süß, aromatisch. |
| L-15-01-217 | Tomate | 'Striped Roman' | Solanum lycopersicum L. | Flaschentomate mit rot-gelb gestreiften, länglichen, zugespitzten, milden Früchten. Festfleischige Lagersorte. |
| L-15-01-218 | Tomate | 'Stupice' | Solanum lycopersicum L. | Rote Fleischtomate, rund-oval, z.T. mit leichter Spitze. |
| L-15-01-219 | Tomate | 'Sub-arctic Maxi' | Solanum lycopersicum L. | Kältetolerante, früh reifende Buschtomate, Früchte flachrund, rot, platzfest. |
| L-15-01-221 | Tomate | 'Sub-arctic Plenty' | Solanum lycopersicum L. | Kältetolerante, früh reifende und ertragreiche Buschtomate, Früchte rund, rot, platzfest. |
| L-15-01-222 | Tomate | 'Super Snow White Cherry' | Solanum lycopersicum L. | Fleischtomate, gelb, flachrund, leicht gerippt, eher feste Schale, milder Geschmack. Mittlere Reife, ertragreich. |
| L-15-01-224 | Tomate | 'Tigerella' | Solanum lycopersicum L. | Normalfrüchtige Stabtomate mit aromatischen, saftigen, würzig-säuerlichen, roten Früchte mit gelb-orangen Streifen. In England beliebte Sorte. |
| L-15-01-225 | Tomate | 'Tomato Slava' | Solanum lycopersicum L. | Salattomate, hellrot, rund-rundoval, ungleichmäßig geformt, schnittfeste Schale. Süß-aromatisch, sehr früh. |
| L-15-01-226 | Tomate | 'Tommy Toe' | Solanum lycopersicum L. | Cocktailtomate, rot. Früchte unregelmäßig rund, etwas abgeflacht, saftig-mehlig, dicke Fruchtwände. Platzfest, frühreif, fruchtig, süß, aromatisch. Reicher, lang anhaltender Ertrag, viele Rispen, sehr wüchsig, Ursprung USA. |
| L-15-01-227 | Tomate | 'Tondo Giallo' | Solanum lycopersicum L. | Gelbe bis dunkelgelbe Salattomate, rund, saftig, angenehme Säure, bei Vollreife glasig-wässrig, daher vorher ernten. Mittelfrüh, schwachwüchsig. |
| L-15-01-228 | Tomate | 'Toskana' | Solanum lycopersicum L. | Stabtomate mit großen, fleischigen, ovalen Früchten, rot leicht grün geflammt mit einzelnen grünlichen Längsstreifen. Saftig, aromatisch mit weicher Schale. Gute Soßentomate. |
| L-15-01-229 | Tomate | 'Tumbling Tom Red' | Solanum lycopersicum L. | Frühe Cocktail-Buschtomate mit roten Früchten. Gut für Ampeln, Kübel, Balkonbepflanzung. |
| L-15-01-230 | Tomate | 'Tyckové' | Solanum lycopersicum L. | Salattomate, hellrot, rund, schnittfeste Schale. |
| L-15-01-231 | Tomate | 'Ungarische Trauben' | Solanum lycopersicum L. | Starkwüchsige rote Cocktailtomate, ungleichmäßig rund, süß aromatisch, feste Schale, robust gegen Braunfäule. |
| L-15-01-233 | Tomate | 'Waltingers Cocktailtomate' | Solanum lycopersicum L. | Cocktailtomate. Rote, runde, sehr aromatische Früchte mit zum Ende des Fruchtstandes hin kleiner werdenden Früchten. Frühe Reife. Wüchsig und robust. |
| L-15-01-235 | Tomate | 'Weintraube Östreicher' | Solanum lycopersicum L. | Sehr früh reifende, leuchtend rote, normalfrüchtige Salattomate mit relativ fester Schale. Süß, fruchtig und aromatisch im Geschmack. |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------------------------|-------------------------|--|--|
| L-15-01-237 | Tomate | 'White Tomato' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, hellgelb bis weißlich gelb, flachrund, leicht gerippt, spät reifend. Geschmack leicht säuerlich-mild, feste Schale, kaum Samen. |
| L-15-01-238 | Tomate | 'Wilde Rose' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate mit großen, flachrunden und schwach gerippten, rosa und etwas gelbkragigen Früchten, saftig, wenig Säure. Russische Sorte. |
| L-15-01-239 | Tomate | Wildtomate Pruniformis | Solanum lycopersicum L. | | Wildtomate Pruniformis. Rote, früh reifende Cocktailtomate mit birnenförmigen sauren Früchten. |
| L-15-01-240 | Tomate | 'Willims Lager Orangefrüchtig' | Solanum lycopersicum L. | | Lagertomate. Früchte reifen an den zum Trocknen aufgehängten Pflanzen nach. |
| L-15-01-241 | Tomate | 'Yasha Yugoslavian' | Solanum lycopersicum L. | | Ochsenherztomate, rosa-rosarot, herzförmig, ausgeprägte Spitze, große Früchte, viel Fruchtfleisch und wenigen Samen. |
| L-15-01-242 | Tomate | 'Yellow Cherry' | Solanum lycopersicum L. | | Cocktailtomate mit runden kirschgroßen, gelben Früchten, süß-säuerlich, fruchtig. Sehr wüchsige robuste Naschtomate, kann mehrtriebig gezogen werden. |
| L-15-01-243 | Tomate | 'Yellow Ruffled' | Solanum lycopersicum L. | | Stabtomate mit gelben, länglichen, stark gerippten, mild schmeckenden Früchten, kernarm, hohl, außergewöhnliche Rarität, zum Füllen geeignet. |
| L-15-01-244 | Tomate | 'Yellow Submarine' | Solanum lycopersicum L. | | Robuste starkwüchsige Cocktailtomate, mit gelben, birnenförmigen, süßen Früchten mit eher weicher, nicht ganz platzfester Schale. Kartoffelblättriger Typ. |
| L-15-01-245 | Tomate | 'Zäpfle' | Solanum lycopersicum L. | | Flaschentomate, rot. Länglich birnenförmige kleinere Früchte mit eher fester Schale. Sehr wüchsig und gesund. |
| L-15-01-246 | Tomate | 'Zaryanka Sunrise' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, rötlich orange, flachrund, saftig, eher feste Schale, spät. Milder Geschmack, cremiges Fruchtfleisch. |
| L-15-01-247 | Tomate | 'Zorza' | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, himbeerrot. Flachrunde, leicht gerippte Früchte. Ertragreiche kartoffelblättrige Sorte aus Polen |
| L-15-01-248 | Tomate | 'Zuckertraube' | Solanum lycopersicum L. | | Stabtomate. Süß-aromatische, rote kleinfrüchtige Cocktailtomate, kräftig wachsend, ertragreiche Naschsorte. |
| L-15-01-249 | Tomate | 'Auriga' | Solanum lycopersicum L. | | Robuste frühreife Freilandtomate mit orangen, runden, platzfesten Früchten. Guter Geschmack mit wenig Säure. Früher in der DDR weit verbreitet. |
| L-15-01-250 | Tomate | 'Besser' | Solanum lycopersicum L. | | Alte robuste deutsche Sorte aus dem Raum Freiburg stammend. Süße etwas größere Cocktailtomate mit traubenförmigen Fruchtständen. Ertragreich und früh. |
| L-15-01-251 | Tomate | 'Black Seaman' | Solanum lycopersicum L. | | Kleine Fleischtomate mit braunroten, aromatischen, schwach gerippten Früchten. Mittelhoch wachsend (ca. 1,50m), kartoffelblättrig, aus Russland. |
| L-15-01-252 | Tomate | 'Black Zebra' | Solanum lycopersicum L. | | Runde, mittelgroße Salattomate mit fester Schale, rotbraun mit grünen Streifen, rotes Fruchtfleisch. Relativ neue Sorte aus den USA. |

| | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------|-------------------------|--|--|
| L-15-01-253 | Tomate | 'Copia gelb' | Solanum lycopersicum L. | | Goldgelbe Fleischtomate mit feinen roten Streifen. Rot marmoriert, saftig und aromatisch. Aus Kreuzung der Sorten 'Green Zebra' und 'Marvel Striped'. |
| L-15-01-254 | Tomate | 'Copia rot' | Solanum lycopersicum L. | | Rote Fleischtomate mit feinen gelben Streifen. Rot marmoriert, saftig und aromatisch. Aus Kreuzung der Sorten 'Green Zebra' und 'Marvel Striped'. |
| L-15-01-255 | Tomate | 'Hängende Cocktailtomate' | Solanum lycopersicum L. | | Buschtomate mit überhängenden Trieben. Mittelgroße, rote, ovale Früchte. Frühreif und ertragreich. Sehr gut geeignet für Balkon und Kübel. |
| L-15-01-256 | Tomate | 'Indigo Rose' | Solanum lycopersicum L. | | Die unreifen Früchte sind schwarz (Anthocyanin). Bei Reife färbt sich die erst grüne sonnenabgewandte Seite rot. Das Fruchtfleisch ist rot. |
| L-15-01-257 | Tomate | 'Piennolo' | Solanum lycopersicum L. | | Regional geschützte Lagertomate vom Vesuv, wenig gießen, robust, werden traditionell in Büscheln (Piennolo=Pendel) aufgehängt. Ovale Früchte mit kleiner Spitze, festes Fruchtfleisch, süß und aromatisch. |
| L-15-01-259 | Tomate | 'Safari' | Solanum lycopersicum L. | | Dunkelrot-grün gestreifte, sehr feste, süß-säuerliche Cocktailtomate. |
| L-15-01-260 | Tomate | 'Schwarze Birne' | Solanum lycopersicum L. | | Kartoffelblättrige, mittelhohe, schlanke rotbraune, birnenförmige, weiche und dünnchalige, süße mittelspäte Fleischtomate, Gewächshaus oder geschütztes Freiland, ursprünglich aus Moldavien. |
| L-15-01-261 | Tomate | 'Striped Cavern Kanada' | Solanum lycopersicum L. | | Stabtomate. Innen hohle, daher zum Füllen geeignete "Paprika-Tomate". Reif orange-rot gestreift bleibend. Geschmacklich neutral, relativ gut lagerfähig. |
| L-15-01-263 | Tomate | 'Vintage Wine' | Solanum lycopersicum L. | | Höhere Fleisch-Buschtomate bis ca. 1,40m, mild, weich, rosarot-orange gestreift, flachrund, leicht gerippt, neuere kartoffelblättrige Sorte aus den USA. |
| L-15-01-265 | Tomate | 'Ambre' | Solanum lycopersicum L. | | Dunkelgelb-orange Salattomate, rund, leicht gerippt, saftig, mild und süß, schwachwüchsig bis ca. 1,20m |
| L-15-01-266 | Tomate | 'Coeur de boeuf russe' | Solanum lycopersicum L. | | Wüchsige rote Fleischtomate, flach-herzförmig mit breiten Schultern, leicht gekerbt, dünnchalig, süß, aromatisch, sehr fleischig, wenig Samen. |
| L-15-01-267 | Tomate | 'Andenhorn orange' | Solanum lycopersicum L. | | Flaschentomate. Große gelbe, länglich schmale, spitz zulaufende Früchte mit aromatisch-fruchtigem Geschmack. |
| L-15-01-268 | Tomate | 'Eiko' | Solanum lycopersicum L. | | Rote Cocktailtomate mit ovalen Früchten, braunfeuletolerant, Herkunft Japan |
| L-15-01-269 | Tomate | 'White Tomato' | Solanum lycopersicum L. | | Früchte weiß bis leicht gelblich. |
| L-15-01-270 | Tomate | 'Schafsaugen' | Solanum lycopersicum L. | | Spät reifend, relativ braunfäuletolerant, 2-3 cm große auffällige lila-schwarze Früchte, recht geschmacksneutral/mild. |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|
| L-15-01-271 | Tomate | 'San Berao' | Solanum lycopersicum L. | | Mild-aromatische Marktomate, Neuzüchtung mit der Wuchskraft von De Berao und dem Geschmack und der Form, ähnlich San Marzano. Nicht so anfällig gegenüber der Blütenendfäule. Wenig Saft, feste Schale und dickes Fruchtfleisch. Besonders freilandgeeignet. |
| L-15-01-272 | Tomate | Herkunft: Ungarn | Solanum lycopersicum L. | | Kleine, eiförmige, aromatisch-ausgewogene, rote Tomate, feine Schale, sehr robust. Aus den Weinbergen in Ungarn |
| L-15-01-277 | Tomate | 'Arcansas' | Solanum lycopersicum L. | | Schwachwüchsige Tomate, mit roten, unregelmäßigen, stark gebuchteten Früchten |
| L-15-01-278 | Tomate | 'Balkonzauber' | Solanum lycopersicum L. | | rote Buschtomate, erzüchtet in der DDR beim VEG Gattersleben, von Elfriede Illner und Dr. Hartmut Arndt. Sie kam 1984 auf den Markt. Höhe bis zu 50 cm, Salattomate |
| L-15-01-279 | Tomate | 'Camone' | Solanum lycopersicum L. | | Rote Stabtomate aus den Niederlanden. Seit 1980ern auf Sardinien gepflanzt und mit Meerwasser gegossen dadurch einzigartiger süß-salziger Geschmack. |
| L-15-01-280 | Tomate | 'Costoluto Fiorentino' | Solanum lycopersicum L. | | Alte Fleischtomatensorte aus der Toskana, Schöne, stark gerippte, flachrunde Früchte mit fruchtig-süßem Aroma |
| L-15-01-281 | Tomate | 'Dwarf Purple Heart' | Solanum lycopersicum L. | | Buschtomate (120cm), von Vincent Lavallo (2015), Frucht mittelgr., burgunderrot, mit olivgrünen Schultern, platzfest, aromatisch, fruchtig, süß, Schale weich |
| L-15-01-282 | Tomate | 'Feuerwerk' | Solanum lycopersicum L. | | Rot-gelb gestreifte Fleischtomate aus Russland mit variabler Fruchtform. Höhe bis zu 180cm |
| L-15-01-283 | Tomate | 'Giant Belgium' pink | Solanum lycopersicum L. | | Fleischtomate, rosa, gleichmäßig geformt, leicht gerippt, flachrund, festes Fleisch, frühreif, aromatisch, fruchtig-säuerlich. Wüchsige, mittelgroße Sorte aus den USA. |
| L-15-01-284 | Tomate | 'Perldrops orange' | Solanum lycopersicum L. | | Stabtomate mit orange-roten, perlförmigen, ca. traubengroßen Früchten, fruchtig-säuerlicher Geschmack. |
| L-15-01-285 | Tomate | 'Sweet Sue Dwarf' | Solanum lycopersicum L. | | Kartoffelblättrige Tomate, die nicht höher als 1,50m wird. Leuchtend gelbe Früchte, glatt, unregelmäßig - leicht abgeflacht oder kugelförmig |
| L-15-01-286 | Tomate | 'Téton de Venus' | Solanum lycopersicum L. | | Mittelgroße, rote, zwiebel- oder herzförmige Ochsenherztomate. Fruchtfleisch zart, fruchtig, süß |
| L-15-01-287 | Tomate | 'White Oxheart' | Solanum lycopersicum L. | | Cremeweiße Ochsenherztomate |
| L-15-02-001 | Johannisbeer-Tomate | 'Goldtröpfchen' | Solanum pimpinellifolium L. | | Sehr kleine, gelbe Früchte, gesund, lagerfähig, aber mit wenig Aroma. Die wüchsige Pflanze kann mehrtriebzig gezogen werden. |
| L-15-02-002 | Johannisbeer-Tomate | Johannisbeertomate rot | Solanum pimpinellifolium L. | | Rote, runde, sehr kleine Früchte. |

| | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|--|--|
| L-15-02-003 | Wild-Tomate | Herkunft: Peru | Solanum pimpinellifolium L. | | Wüchsige robuste kleinfrüchtige Cocktailtomate mit roten säuerlich schmeckenden Früchten an langen Rispen. |
| M-99-09-004 | Tomate MIX | | Solanum lycopersicum L. | | Bunte Tomaten-Überraschungstüte. Mix verschiedener Sorten unterschiedlicher Farbe, Wuchs und Größe |

OBST

| | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| A-18-01-001 | Aprikose, Marille | 'Eichstetter Kleinfrüchtige' | Armeniaca vulgaris Lam. | | Samenechte Sorte, aromatisch und festfleischig. Zur Fruchtreife Kerne |
| F-02-01-001 | Garten-Erdbeere | | Fragaria × ananassa Duch. | | Verschiedene Sorten, Wurzelackte Pflanzen. Vorzugweise von November bis März. |
| F-02-03-001 | Wald-Erdbeere | 'Multiplex' | Fragaria vesca L. | | Gefüllt blühende Zierform. Wurzelackte Pflanzen. Vorzugsweise von November bis März. |
| F-02-03-002 | Wald-Erdbeere | 'Rügen' | Fragaria vesca L. | | Aromatische, rotfrüchtige Monatserdbeere ohne Ausläufer. |
| M-11-01-001 | Großfrüchtige Mispel | | Mespilus germanica L. | var. macrocarpa DC. ex Lam. et DC. | Großfrüchtige Sorte, die sich zum Rohverzehr, für Marmelade und zur Herstellung von Mus eignet. Edelreiser nach Absprache. |
| P-08-01-002 | Pfirsich | Weinbergspfirsich | Persica vulgaris P. Miller | | Weinbergspfirsich. Samenechte Sorte, aromatisch. Steine zur Zeit der Fruchtreife |

RARITÄTEN

ÖLPFLANZEN

| | | | | | |
|-------------|--------------------|------------|--------------------------|--|---|
| B-05-01-001 | Abessinischer Senf | ohne Namen | Brassica carinata A. Br. | | In Europa selten kultivierte Kohlart. Saatgut fällt kaum aus. Nutzung als Öl-, Würz- und Gemüsepflanze. |
| B-05-01-002 | Abessinischer Senf | ohne Namen | Brassica carinata A. Br. | | In Europa selten kultivierte Kohlart. Saatgut fällt kaum aus. Nutzung als Öl-, Würz- und Gemüsepflanze. |
| S-08-08-001 | Sesam | | Sesamum indicum L. | | Antike, tropische Ölpflanze, die seit Jahrtausenden in China und Indien angebaut wird. Lange Wachstumsperiode, braucht viel Wärme, daher lohnt sich der Anbau im Freiland nur in den wärmsten Gegenden. Vorkultur! |

ÖL- und ZIERPFLANZEN

| | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|--|---|
| H-01-01-001 | Sonnenblume | Landsorte | Helianthus annuus L. | | Landsorte. Samen länglich, grau-weiß gestreift. |
| H-01-01-002 | Sonnenblume | 'Russian Black' | Helianthus annuus L. | | Mittelhohe Sorte mit großen gelben Blüten. Eher unverzweigt. Samen mittelgroß, schwarz. |
| H-01-01-003 | Sonnenblume | 'Sheperds Tall Ornamental' | Helianthus annuus L. | | Mittelhohe, relativ stark verzweigte, mehrfarbige Sorte. Samen klein, schlank, schwarz, braun oder weiß mit grauen Flecken oder Streifen. |
| H-01-01-004 | Sonnenblume | Herkunft: Ungarn | Helianthus annuus L. | | Mittelhohe Sorte mit großen, gelben Blüten, Samen schwarz-weiß gestreift. |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|
| L-10-02-001 | Lein, Flachs | 'Hohenheimer Blaublühender' | Linum usitatissimum L. | ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. elatum-multicaule Schur | Blau blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun. |
| L-10-02-002 | Lein, Flachs | 'Deutscher Winter-Lein' | Linum usitatissimum L. | ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. elongatum- multicaule Schur | Blau blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun. |
| L-10-02-003 | Lein, Flachs | 'Hohenheimer Weißblühender' | Linum usitatissimum L. | ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. regale Scheidw. | Weiß blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun. |
| L-10-02-004 | Lein, Flachs | | Linum usitatissimum L. | ssp. usitatissimum convar. mediterraneum (Vavilov et Elladi) Kulpa et Danert var. mediterraneum | Pflanze kleiner als 70 cm. |
| L-10-02-006 | Öl-Lein | | Linum usitatissimum L. | | Gelbsamiger chinesischer Öllein (Nachbau aus dem Handel). |
| P-02-04-002 | Schlaf-Mohn | Herkunft: Eichstetten | Papaver somniaferum L. | | Schüttmohn mit dunkelbraunen Samen, Kapsel stark abgeflacht. |
| P-02-04-007 | Schlaf-Mohn | | Papaver somniaferum L. | | Verzweigter Schüttmohn mit kleinen, rundlichen Kapseln und dunkelbraunen Samen. Es dürfen nicht mehr als 99 Pflanzen angebaut werden |
| P-02-04-008 | Schlaf-Mohn | | Papaver somniaferum L. | | Bunte Mischung verschiedener Schlafmohnsorten (verkreuzt). Es dürfen nicht mehr als 99 Pflanzen angebaut werden |
| DIVERSE RARITÄTEN | | | | | |
| A-01-01-001 | Okra | Herkunft: Pakistan | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | | Großfrüchtige Sorte aus Pakistan, gedeiht im Tunnel gut. |
| A-01-01-002 | Okra | | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | | Großfrüchtige Sorte, gedeiht im Tunnel gut. |
| A-01-01-003 | Okra | | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | | Freilandtaugliche Sorte mit kurzen, stark behaarten Früchten. Eher zur Dekoration geeignet. |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------------|--|--|---|
| A-01-01-004 | Okra | | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | | Anbau im Tunnel oder Gewächshaus. |
| A-01-01-005 | Okra | | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | | Großfrüchtige Sorte aus Afganistan, besser im Tunnel. |
| A-01-01-006 | Okra | 'Clemson Spineless' | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | | Länglich zugespitzte, dunkelgrüne Früchte mit sehr zartem Fruchtfleisch, bei ca. 8cm Länge erntreif. Liebt Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit. Sonniger Standort, keine besonderen Bodenansprüche. Gut zum Einfrieren und Konservieren. Freilandtauglich |
| A-19-09-001 | Spargel | | Asparagus officinalis L. | | Mischung aus Lila-grünem und grünem Spargel. Ausdauernde Staude, die jungen, aus der Erde sprießenden Sprosse werden ungeschält gegessen. Eine erste Ernte ist frühestens nach 3 Jahren möglich. |
| C-20-01-002 | Kichererbse | | Cicer arietinum L. | | Schwarzsamige Sorte. |
| C-28-01-001 | Langkapselige Jute | | Corchorus olitorius L. | | Wärmeliebende Faser- und Gemüsepflanze. Gegessen werden die junge Sprosse und Blätter. |
| C-39-01-001 | Kardy/Kardone | | Cynara cardunculus L. | | Im Mittelmeerraum beliebtes Blattstielgemüse, dass gebleicht wird, in Deutschland fast unbekannt. |
| G-04-01-001 | Römische Lakritze | ohne Namen | Glycyrrhiza echinata L. | | Ausdauernde, anspruchslose Pflanze, die weit ausläufern kann. |
| V-04-05-001 | Futter-oder Saatwicke | 'Steinacher Hellsamige' | Vicia sativa L. var. sativa | | Futterpflanze, auch verwildernd. |

ERDNÜSSE

| | | | | | |
|-------------|---------|------------------------|---------------------|--|--|
| A-17-03-002 | Erdnuss | Herkunft: Brasilien | Arachis hypogaea L. | | Vorkultur ab April. Rötliche Haut. |
| A-17-03-006 | Erdnuss | Herkunft: Senegal | Arachis hypogaea L. | | Aus der senegalesischen Region Louga. Vorkultur ab April. Bräunliche Haut. |

WILD- UND BEIKRÄUTER

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|---|
| A-03-01-001 | Kornrade | | Agrostemma githago L. | | Selten gewordenes Getreideunkraut. Verschiedentlich für bunte Blühstreifen empfohlen. |
| A-20-01-001 | Acker-Meier | | Asperula arvensis L. | | Durch Intensivierung der Landwirtschaft ausgerottetes Ackerunkraut. |
| B-07-01-001 | Roggen-Trespe | | Bromus secalinus L. | | Selten gewordenes Unkraut, auch Futtergras. |
| B-08-01-002 | Rundblättriges Hasenohr | | Bupleurum rotundifolium L. | | Gefährdetes Ackerunkraut, seit einigen Jahren auch als Trockenblume in Kultur. |
| C-01-01-001 | Acker- Ringelblume | | Calendula arvensis L. | | Selten gewordenes Ackerunkraut, das fast das ganze Jahr lang leuchtend gelb blüht. |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|--|---|---|
| C-12-01-001 | Kornblume | | <i>Centaurea cyanus</i> L. | | Einjährige, krautige Pflanze mit blauen bis violetten Blüten. Ackerunkraut und Zierpflanze. Aussaat im Herbst oder Frühjahr. |
| C-15-01-001 | Kleine Wachsblume | | <i>Cerithe minor</i> L. | | Selten gewordenes Ackerunkraut, auch Bienenweide. Gelbe, spitze Blüten |
| C-15-02-001 | Große Wachsblume | | <i>Cerithe major</i> | | Seltene Unkrautart, die auch als Zierpflanze gebräuchlich ist. Blüten rötlich-violett. |
| C-16-01-001 | Kleines Leinkraut | | <i>Chaenarrhinum minus</i> (L.) Lange | | Auch Klaffmund oder Kleiner Orant. Unkraut lehmiger Äcker und Weinberge. |
| C-26-01-001 | Weißer Ackerkohl | | <i>Conringia orientalis</i> (L.) Dum. | | Seltene und unbeständiges Ackerunkraut, wärmeliebend. |
| C-27-02-001 | Feld-Rittersporn | | <i>Consolida regalis</i> S.F. Gray | | Durch Intensivierung der Landwirtschaft selten gewordenes Ackerunkraut. Einjährig, blau blühend. |
| G-02-02-001 | Saat-Wucherblume | | <i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr. (= <i>Chrysanthemum segetum</i> L.) | | Seltene Ackerunkraut, das wie die Speise-Chrysantheme verwendet werden kann. |
| K-01-02-001 | Unechtes Tannelkraut | | <i>Kickxia spuria</i> L. | | Auch Eiblättriges Tannelkraut genannt. Wärmeliebender Lehmzeiger, Unkrautart. |
| O-03-01-001 | Strahlen-Breitsame | | <i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm. | | Weißblühendes, auffälliges Ackerunkraut. Wird gelegentlich als Ersatz für Schleierkraut kultiviert. |
| P-02-03-001 | Klatsch-Mohn | | <i>Papaver rhoeas</i> L. | | Häufiges Ackerunkraut, Pollenspender für Wildbienen, früher auch als Heilpflanze gebräuchlich. |
| R-02-01-001 | Hederich | | <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | ssp. <i>landra</i> (Moretti ex DC.) Bonnier et Layens | Kurz geschnäbelte Herkunft aus Südwest-Frankreich, dort ruderal. |
| S-09-01-001 | Ackerröte | | <i>Sherardia arvensis</i> L. | | Ackerunkraut auf warmen, lehmig-tonigen Böden. |
| S-10-02-001 | Acker-Leimkraut | | <i>Silene noctiflora</i> L. | | Einjähriges oder überwintertes klebriges Ackerunkraut mit rosa, sich abends öffnenden Blüten. |
| S-12-02-001 | Acker-Senf | | <i>Sinapis arvensis</i> L. | | Häufiges Ackerunkraut, dessen braune Samen wie die des Weißen Senfs verwendet werden können, Blätter und Knospen auch als Gemüse. Teils anliegende Schoten. |
| S-16-01-001 | Acker-Spörgel | | <i>Spergula arvensis</i> L. | | Alte Gemüse- und Futterpflanze, heute nur noch Unkraut. Fördert die Milchbildung und erhöht deren Fettgehalt. |
| V-04-06-001 | Zottel-Wicke | | <i>Vicia villosa</i> Roth | | Ackerunkraut |
| V-06-01-001 | Acker-Stiefmütterchen | | <i>Viola arvensis</i> Murray | | Zunehmend herbizidtolerantes Ackerunkraut. |

| KÜRBISGEWÄCHSE | | | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|---|
| C-34-02-001 | Horngurke, Kiwano | | Cucumis metuliferus E. Mey. Ex Naudin | | Bedingt freilandtaugliche, aus Afrika stammende Kulturpflanze mit sehr dekorativen Früchten. |
| C-38-01-001 | Explodiergurke | | Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn. | | Stark rankend. Unreife Früchte haben intensives Gurkenaroma und können roh verzehrt werden. |
| L-13-02-001 | Schwammgurke, Luffa | | Luffa aegyptiaca Mill. | | Badeschwamm, Früchte jung als Gemüse |
| M-08-01-001 | Melothria | | Melothria scabra Naud. | | Mexikanische Minigurke. Stark rankendes Kürbisgewächs mit kleinen, gemusterten Früchten, die man roh essen und einlegen kann. |

WURZEL- UND KNOLLENGEMÜSE

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|
| A-16-01-002 | Knollensellerie | 'Tellus' | Apium graveolens L. | var. rapaceum (Mill.) Gaud. | Kleiner, fester Knollensellerie mit intensivem Aroma. |
| A-23-01-001 | Speise- oder Gemüse-Klette | | Arctium lappa | var. edule | Zweijähriges winterfestes Wurzelgemüse mit bis zu 1m langen Pfahlwurzeln. Verwendung wie Schwarzwurzeln. Junge Laubblätter und Stängel essbar. Alte Heilpflanze. Lange Keimzeit, Wuchshöhe 1-1,50m. |
| B-02-01-009 | Rote Bete/Rübe | 'Rote Kugel' | Beta vulgaris L. | ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris | Runde, glattschalige, sehr gut lagerfähige Rübe mit gut durchgefärbtem dunkelrotem Fleisch. Eichstetter Auslese mit kleinem, dunkelrotem Blatt. |
| B-02-01-010 | Rot-Weiße Bete/Rübe | 'Tondo di Chioggia' | Beta vulgaris L. | ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris | Rot-weiß geringelte Rübe aus Italien. |
| C-40-01-002 | Erdmandel | ohne Namen | Cyperus esculentus L. | | Zahlreiche kleinere, längliche Knöllchen. Delikate Knabberei, roh oder auch geröstet verwendbar. |
| C-40-01-004 | Erdmandel | | Cyperus esculentus L. | | Zahlreiche kleinere, längliche Knöllchen. Delikate Knabberei, roh oder auch geröstet verwendbar. |
| D-03-01-007 | Möhre | 'Küttiger Rübli' | Daucus carota L. | ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart. | Elitesaatgut. Rein weiße, spitzkegelige, aromatische Rüben. Alte Sorte aus der Schweiz. |
| D-03-01-008 | Möhre | 'Rotherz' | Daucus carota L. | ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart. | Kurzkegelige, orange-rote Karotte. Erhaltungszüchterisch bearbeitete Handelssorte. |
| D-03-01-010 | Möhre | 'Lobbericher' | Daucus carota L. | ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart. | Saftige, lange Lagermöhre, zylindrisch bis leicht konisch, Spitze oft deutlich abgesetzt. Goldgelbe Farbe mit kleinem grünem Kopf. Ursprünglich vom Niederrhein. |
| D-03-01-011 | Möhre | 'Pariser Markt' | Daucus carota L. | ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart. | Sehr frühe, runde bis plattrunde Möhre mit intensiv oranger Färbung und süßem Geschmack. Je kleiner, desto zarter. Gut geeignet für den Balkonkasten. |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| D-06-01-003 | Yams | ohne Namen | Dioscorea opposita Thunb. (= D. batatas Decne) | | Lichtwurzel ®. Rechtlich geschützte Marke aus Überlingen, weibliche Pflanze. |
| F-01-01-002 | Knollenfenchel | 'Fino' | Foeniculum vulgare Mill. | ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell. | Schossfeste robuste Sorte mit flachen Knollen für die Frühlkultur. Erhaltungszucht. |
| H-01-02-002 | Topinambur | ohne Namen | Helianthus tuberosus L. | | Ertragreiche Sorte mit großen, weißen Knollen. Abgabe vor und nach der Frostperiode. |
| H-01-02-003 | Topinambur | | Helianthus tuberosus L. | | Sorte mit kleineren, außen rötlichen Knollen. Abgabe vor und nach der Frostperiode. |
| I-05-04-001 | Süßkartoffel | | Ipomoea batatas (L.) Lam. | | Batate, rotschalig |
| I-05-04-002 | Süßkartoffel | | Ipomoea batatas (L.) Lam. | | gelbschalig |
| O-05-01-001 | Knolliger Sauerklee / Oka | Gelbknollig | Oxalis tuberosa Molina | | Nicht ganz frosthartes Blatt- und Wurzelgemüse aus den Anden mit wenig Oxalsäure, das über Knollen vermehrt wird. Diese bilden sich erst sehr spät im Jahr. Verwendung wie Kartoffeln, roh, gebraten oder gekocht. |
| O-05-01-002 | Knolliger Sauerklee / Oka | Rotknollig | Oxalis tuberosa Molina | | Nicht ganz frosthartes Blatt- und Wurzelgemüse aus den Anden mit wenig Oxalsäure, das über Knollen vermehrt wird. Diese bilden sich erst sehr spät im Jahr. Verwendung wie Kartoffeln, roh, gebraten oder gekocht. |
| P-03-01-002 | Pastinake | 'Eichstetter Halblange Weiße' | Pastinaca sativa L. | ssp. sativa | Stumpf kegelförmige bis rundliche Auslese. Die oberirdischen Pflanzenteile sind phototoxisch und können unter Lichteinfluss zu Hautreizungen führen. |
| R-02-02-001 | Rettich | von Herrn Bhatti 28 | Raphanus sativus L. | | Landsorte. Landsorte, von der auch das Laub gegessen wird. |
| S-18-00-002 | Knollen-Ziest | gelbknollig | Stachys affinis Bunge | | Auch Crosne, Stachys. Bildet unterirdische Ausläufer, die sich an der Spitze perlschnurartig verdicken. Wintergemüse mit zartem Geschmack nach Schwarzwurzel und Artischocke. Ernte im Spätherbst, frosthart. Nur vegetativ vermehrbar. |
| T-08-01-001 | Haferwurz | | Tragopogon porrifolius L. | | Altes, fast vergessenes, winterhartes Wurzelgemüse, süßlich-nussiger Geschmack. Wie Schwarzwurzel zu verwendenden. Die Blätter sind als Salat nutzbar. Sehr dekorative, violette Blüten im 2. Jahr. |

ZIERPFLANZEN

| | | | | | |
|-------------|------------------|--|----------------|------------|---|
| A-04-01-002 | Garten-Stockrose | | Alcea rosea L. | var. nigra | Zierpflanze mit schwarzroten Blüten. Wurde früher zum Färben von Textilien von violett bis graublau und zum Färben von Rotwein, Likör, Lebensmitteln und Speisen genutzt. |
|-------------|------------------|--|----------------|------------|---|

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|----------------|--|----------------------|--|
| A-04-01-004 | Garten-Stockrose | Bunte Mischung | Alcea rosea L. | | Zierpflanze, alte Bauerngartenpflanze, Blüten auch für Tee, Blütenfarbe variabel |
| A-14-01-001 | Garten-Löwenmaul | | Antirrhinum majus L. | | Hoch wachsende, bunt blühende Mischung. |
| A-17-01-001 | Gemeine Akelei | ohne Namen | Aquilegia vulgaris L. | | Mehrjährige Zierpflanze, die gern von Hummeln besucht wird. Blüten blau-violett, selten rosa. |
| A-19-05-001 | Kletter-Löwenmäulchen | | Asarina scandens (Cav.) Pennell | | Kletterlöwenmäulchen. Einjährige Schlingpflanze mit kleinen violetten Blüten. Geeignet für Zäune, auch als Hängepflanze für Ampeln oder Balkonkästen. |
| B-06-01-001 | Großes Zittergras | | Briza maxima L. | | Dekoratives, einjähriges Gras, auch für Trockensträuße geeignet. |
| C-01-02-001 | Garten-Ringelblume | | Calendula officinalis L. | | Zier- und Heilpflanze, halbgefülle, orange blühende Mischung. |
| C-03-01-001 | Sommer-Aster | ohne Namen | Callistephus chinensis (L.) Nees | | Mehrfarbige Sommerblume. |
| C-24-00-000 | Spinnenpflanze | | Cleome sp. | | Weiß blühende Art, als Zierpflanze verwendet. |
| C-29-01-001 | Färber-Mädchenauge | | Coreopsis tinctoria Nutt. | | Auch Schöngesicht. 50-80cm hohe einjährige Zier- und Färbepflanze. Lange und reichblühende Schnittblume mit gelben bis rotbraunen Blüten. Lichtkeimer. Aus den Blüten lässt sich ein gelboranger Farbstoff gewinnen. |
| C-32-01-001 | Schmuck-Körbchen | | Cosmos bipinnatus Cav. | | Bekannte Sommerblume mit rosa und weißen Blüten. |
| C-32-02-001 | Schwefel-Kosmee | | Cosmos sulphureus Cav. | | Orange-gelbes Schmuckkörbchen. Lang blühende einjährige Sommerblume. |
| D-01-01-001 | Dahlie | | Dahlia × hortensis Guillaumin | | Zwergdahlie mit roten und gelben Blüten, Samen aus freier Abblüte mehrerer Sorten. |
| D-01-01-003 | Dahlie | | Dahlia × hortensis Guillaumin | | Zwergdahlie, Samen aus freier Abblüte mehrerer Sorten, rot und gelb blühend. |
| D-02-01-001 | Stechapfel | | Datura stramonium L. | f. tatula (L.) Torr. | Einjährige, stark giftige Zierpflanze. Die blaß-violetten Blüten öffnen sich abends. |
| D-04-00-001 | Bartnelke | | Dianthus barbatus L. | | Zweijährige Bauerngartenpflanze mit gefüllten Blüten in rot, rosa und weiß, z.T. zweifarbig. Direktsaat April bis Anfang Juli, Auspflanzung bis Oktober an sonnigen Standort. |
| D-04-01-001 | Karthäuser-Nelke | | Dianthus carthusianorum L. | ssp. carthusianorum | Ausdauernde Wildpflanze mit purpurnen Blüten. |
| E-02-01-001 | Stachel- oder Igelgurke | | Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray | | Kletterndes Kürbisgewächs, ungenießbar aber mit dekorativen Blütenständen und Früchten. |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| E-05-01-001 | Kalifornischer Mohn | | Eschscholzia californica Cham. | | Auch Goldmohn. Einjährige Zierpflanze mit leuchtend orangefarbenen Blüten. |
| H-01-04-002 | Roselle, Hibiskus, Rama | Afrikanische Malve | Hibiscus sabdariffa L. | | Auch Rama. Die purpurroten fleischigen Kelchblätter und die Blütenblätter werden für Hibiskustee (kalt oder warm) verwendet. Blüte rot mit rotem Grund. Die Pflanze liefert Fasern, die wie Jute verarbeitet werden können. Die grünen Blätter werden gekocht und gut gewürzt zu einem Brei verarbeitet und als Beilage oder Brotaufstrich verwendet werden. |
| I-05-01-001 | Purpur-Prunk-Winde | | Ipomoea purpurea Roth | | Zierpflanze. Einjährige, stark verzweigte Kletterpflanze mit violett-purpurvioletten Trichterblüten. Blüte: Juli-September. |
| I-05-02-001 | Prunk-Winde | | Ipomoea x multifida (Raf.) Shinners | | Sehr hoch rankende einjährige Zierpflanze mit leuchtend roten langgestielten Trichterblüten. Blätter geschlitzt fächerförmig. Sonniger Standort. |
| I-05-03-001 | Prunk-Winde | | Ipomoea hederifolia | | Gefiederte Blätter, leuchtend rote kleine Blüten, robuste Zierpflanze, die bis 5 m hoch ranken kann |
| L-06-02-001 | Sibirisches Herzgespann, Marihuanilla | | Leonorus sibiricus | | Bis 2 m hohe, einjährige Zierpflanze, gute Bienenweide |
| L-12-01-001 | Blauer Männertreu | | Lobelia erinus L. | | Blau blühende, einjährige Zierpflanze. |
| L-14-03-001 | Garten-Lupine | vom Zeller Blauen | Lupinus polyphyllus Lindl. | | Ausdauernde Zierpflanze, neigt zur Verwilderung. |
| M-05-01-001 | Levkoje | 'Nachtduft' | Matthiola cf. incana (L.) W. T. Aiton | | Violett und ungefüllt blühende Herkunft aus Afghanistan. |
| M-14-01-001 | Wunderblume | | Mirabilis jalapa L. | | Nicht winterharte Staude mit sich abends öffnenden Blüten in pink-rot. Blütezeit von VI-X. Höhe 60-100cm. Im Spätherbst kann man Knollen ausgraben und wie Dahlien überwintern. |
| M-99-09-001 | Blüh- und Gründüngungsmischung | 5-10 qm, 7 Euro | | | Bunte, eher hochwüchsige, teils versamende Blüh- Bienenweide – und Gründüngungsmischung zur Ausbringung ab Mitte Mai. Inhalt siehe Rückseite |
| M-99-09-006 | Rittersporn Mischung | | Consolida ajacis (L.) Schur | | Rosa, weiß und blau blühende einjährige Zierpflanze. Mischung aus Garten-Rittersporn, Feld-Rittersporn, Orientalischer Rittersporn |
| N-02-01-001 | Elfenspiegel | | Nemesia strumosa Benth. | | Vielfarbige buschig wachsende einjährige Zierpflanze. Sie wird dreißig bis vierzig Zentimeter hoch und blüht in der Zeit zwischen Juni und September. |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---|---|---|
| O-04-02-001 | Glücksklee | | <i>Oxalis tetraphylla</i> Cav. | | Oder vierblättriger Sauerklee. Endemische Art aus Mexiko. Nicht frostharte, mehrjährige, krautige Zwiebelpflanze, etwa 20 Zentimeter hoch. Blüten, Blätter (Oxalsäure!), Wurzeln und Zwiebelchen sind essbar. Zieht im Herbst ein. Auch als Zimmerpflanze geeignet. |
| P-02-03-002 | Seiden-Mohn | | <i>Papaver rhoeas</i> L. | | Mehrfarbig blühende Zierformen des Klatschmohns, teils gelb milchend. |
| P-02-08-001 | Passionsfrucht | | <i>Passiflora incarnata</i> L. | | Nordamerikanische winterharte Passionsblume, bildet gelegentlich Früchte und Samen, wenn mindestens zwei Pflanzen zur Verfügung stehen. Wurzelausläufer oder Samen |
| P-18-02-001 | Yacón | weißschalig | <i>Polymnia sonchifolia</i> Poepp et Endl., <i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp et Endl.) H. Rob. | | Kulturform. Vegetativ vermehrbare Art. Nicht winterhart. Knollen roh oder gekocht als Gemüse. Blätter als blutzuckersenkender Tee. |
| P-18-02-002 | Yacón | rotschalig | <i>Polymnia sonchifolia</i> Poepp et Endl., <i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp et Endl.) H. Rob. | | Kulturform. Vegetativ vermehrbare Art. Nicht winterhart. Knollen roh oder gekocht als Gemüse. Blätter als blutzuckersenkender Tee. |
| R-03-01-001 | Rizinus | | <i>Ricinus communis</i> L. | | Auch Wunderbaum. Rotblättrige Sorte, die sich als einjährige Zierpflanze eignet. Buschiger Wuchs, wird 1-2m hoch. Die Samen sind giftig! |
| R-05-01-001 | Moos-Rose | | <i>Rosa × centifolia</i> L. | var. <i>muscosa</i> (Mill.) Ser. f. <i>rosea-plena hort.</i> | Seit mindestens 1930 in Eichstetten kultivierte Sorte, von Frau A. Gerl. Nur Edelreiser. |
| R-05-01-002 | Moos-Rose | | <i>Rosa × centifolia</i> L. | var. <i>muscosa</i> (Mill.) Ser. f. <i>simplex</i> (Andr.) Brumme et Gladis | Ungefüllter Moosrosensämling mit rosa-weiß marmorierter Blüte. Nur Edelreiser. |
| R-05-05-001 | Essig-Rose | Officinalis, Apothekerrose | <i>Rosa gallica</i> L. | | Officinalis, Apothekerrose. Im alten Rom als Duft- und Heilpflanze kultiviert. |
| R-05-06-001 | Schreckliche Rose | | <i>Rosa horrida</i> Fisch. | | Reich widerhakig bestachelte Wildrose, gut für niedrige Hecken und Zäune. |
| R-07-01-001 | Rauher Sonnenhut | | <i>Rudbeckia hirta</i> L. | | Einjährige Sommerblume mit aufrechtem Wuchs, bis 90cm hoch. Blüt gelb-orange mit dunkler Blütenmitte. Als Schnittblume geeignet. |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|--|--|---|
| S-02-03-001 | Schopf-Salbei | | Salvia viridis | | Insekten- und Bienenweide, Schnittblume. Ein Rückschnitt fördert neue Blühpracht. Dekorative rosa-violette Hochblätter |
| S-04-07-001 | Skabiose | | Scabiosa sp. | | Ausdauernde krautige Pflanzen, meist winterhart. Blütenfarbe blau, violett oder weiß. |
| S-10-10-001 | Durchwachsene Silphie, Becherpflanze | | Silphium perfoliatum L. | | Ausdauernder Korbblütler aus Nordamerika bis 3 m hoch, Futter-, Energie- und Zierpflanze mit sonnenblumenartigen gelben Blüten. |
| T-01-00-001 | Hohe Studentenblume | | Tagetes cf. erecta L. | | Einjährige Zier- und Würzpflanze. |
| T-01-02-001 | Studentenblume | 'Ehrenkreuz' | Tagetes patula L. | | Einjährige Zier- und Würzpflanze. |
| T-01-03-001 | Gewürz-Studentenblume | 'Lemon Gem' | Tagetes tenuifolia Cav. | | Aromatische, kleinblütige Polster-Studentenblume. Zier- und Würzpflanze. |
| T-05-01-001 | Mexikanische Sonnenblume | | Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake | | Einjährig gezogene, hohe Zierpflanze mit leuchtend orange-roten Blüten. |
| V-01-01-001 | Kuhnelke | | Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert | | Kuhnelke rosa. Selten gewordenes Ackerunkraut, heute oft in einjährigen Sommerblumenmischungen. |
| V-01-01-002 | Kuhnelke | | Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert | | Kuhnelke weiß. Selten gewordenes Ackerunkraut, heute oft in einjährigen Sommerblumenmischungen. Rein weiße Blüte |
| Z-02-01-002 | Garten-Zinnie | | Zinnia violacea Cav. | | Einjährige, robuste Sommerblume. Gefüllte oder halb gefüllte Blüten in gelb, rot und violett. |

ZWIEBELGEWÄCHSE

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|---|---|---|
| A-05-01-001 | Etagen- oder Luftzwiebel | | Allium × proliferum (Moensch) Schrad. ex Willd. | | Röhriges Laub und Bulbillen als Gewürz verwendbar, auch Zierpflanze. Auch Catawissa-Zwiebel genannt |
| A-05-02-001 | Elefanten- oder Pferde-Knoblauch | | Allium ampeloprasum L. | var. holmense (Mill.) Aschers. et Graebn. | Dem Tunceli-Knoblauch sehr ähnlich, hat fertile, rosa Blüten. |
| A-05-03-002 | Lemgoer Lauch / Lemgoer Zwiebel | | Allium ascalonicum Strand | | Nur vegetativ vermehrbar. Die kleinen Zwiebeln werden als Gemüse verwendet. |
| A-05-05-001 | Schalotte | 'Longor' | Allium cepa L. | var. ascalonicum Backer | Nur vegetativ vermehrbar. |
| A-05-06-001 | Winterhecke-Zwiebel | | Allium fistulosum L. | | Ausdauernde Zwiebel, deren Lauch ganzjährig genutzt werden kann. |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------------|---|-------------------------------|--|
| A-05-08-001 | Großer Schnittlauch | | Allium ledebourianum Roem. et Schult. | | Großer, grobröhriger Schnittlauch. |
| A-05-09-001 | Nickender Lauch | | Allium nutans L. | | Ausdauernder Lauch mit schlanken, dickfleischigen Blättern und zunächst nickenden Blütenköpfen. Gemüse- und Zierpflanze. |
| A-05-10-004 | Perlzwiebel | | Allium porrum L. | var. sectivum F. H. H. Lueder | Kleine, mild-aromatische Zwiebeln zum roh essen oder zum einlegen. Vegetativ vermehrbar. |
| A-05-10-005 | Perlzwiebel | | Allium porrum L. | var. sectivum F. H. H. Lueder | Kleine, mild-aromatische Zwiebeln zum roh essen oder zum einlegen. Vegetativ vermehrbar. |
| A-05-14-001 | Tunceli-Knoblauch | | Allium tuncelianum (Kollman) Özhatay, Matthew et Şiraneci | | Dem Pferde-Knoblauch sehr ähnlich, hat fertile, grünliche Blüten. |
| A-05-04-007 | Kartoffelzwiebel | 'Aurich' | Allium cepa L. | var. aggregatum G. Don | Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind. |
| A-05-04-008 | Kartoffelzwiebel | 'Brodbeck' | Allium cepa L. | var. aggregatum G. Don | Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind. |
| A-05-04-018 | Kartoffelzwiebel | Herkunft: Polen | Allium cepa L. | var. aggregatum G. Don | Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest neuer Zwiebeln, die im Unterschied zur Schalotte leicht trennbar sind. |
| A-05-04-010 | Küchenzwiebel | 'Birnenförmige' | Allium cepa L. | var. cepa | Nachbau einer gelbschaligen Handelssorte. |
| A-05-04-012 | Küchenzwiebel | 'Höri-Bülle' | Allium cepa L. | var. cepa | Helle rotbraune Speisezwiebel, die traditionell auf der Bodensee-Halbinsel Höri angebaut wird. Flache, bauchige Form. Milder zarter Geschmack. |